

Er zou over al die naamwijzigingen nog veel te mopperen zijn, maar daar doe ik liever niet aan. In tegendeel verheug ik er mij over, dat er tusschen Reichenow en Hartert reeds eenige toenadering is te bespeuren en ik zie met verlangen een eventueele nieuwe uitgave van de Hand-list tegemoet. En 't is een kleine moeite, om zooals ik in mijn »Vogeljaar« gedaan heb, voorloopig de beide namenstelsels te gebruiken, die het meeste gezag hebben. Ondertusschen vechten de heeren het uit en spoedig wordt alles weer klaar en eenvoudig.

JAC. P. TH.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Een eigenaardige vergroeiing. — Bijgaande schets geeft een typische vergroeiing weer. Een eschdoorntak doorboort een populier. Hoogstwaarschijnlijk heeft de dikke eschdoorntak

net zoo lang gescheurd en gedrukt tot de popel diep uitgeglepen was, daarna is de tak er in vast gegroeid.


Men zou echter nog kunnen vragen: hoe is dit mogelijk, daar toch eerst de zijtak van den populier dan had doorsneden moeten worden? (Dat de tak er van voren en niet van den achterkant ingekomen is, is aan den uitwas naar voren te zien).

We zullen echter wel moeten aannemen, dat na de vergroeiing de zijtak uit den populier is ontstaan, wat dikwijls meer juist op de plaatsen gebeurt, waar een bepaalde prikkel op is uitgeoefend.

Aan den popelzijtak en den eschdoorntak, die reeds zeer lang zijn, is te zien, dat die vergroeiing vele jaren geleden plaats had.

Geen der boomen heeft blijkbaar geleden, de populier, hoewel de kern geheel doorboord is, is hoog opgeschoten en draagt flink blad, evenals de eschdoorntak.

D. TOLLENAAR,
Station De Bill.



Een eigenaardige vergroeiing van een populier en een Eschdoorn.

CORRESPONDENTIE.

J. M., te A. — De zeer helder blauw gekleurde Bremraap, die u bij Noordwijk vindt, kan wel geweest zijn de Blauwe Bremraap, *Orobanche purpurea*. Deze woekert meest op Duizendblad en wordt, hoewel zelden, in de duinstreek aangetroffen. Een paar andere Blauwe Bremrapen zijn de Bleekke Bremraap, *O. pallidiflora*, die op distels en de Violette Bremraap, *O. amethystea*, die op de Kruisdistels woekert. Beide zijn echter buitengewoon zeldzaam, de laatste zelfs twijfelachtig. De zeer gewone Bitterkruidbremraap, *O. picridis*, doorgaans geelwit, komt ook nog al dikwijls met blauwachtige bloemen voor. De Doornappels worden gekweekt als geneeskruiden. T.

K. Z., te R. — Doodshoofdvinders schijnen dit jaar nog al veel aangekomen te zijn. Ik kreeg er te zien in het noorden van Groningen, ze zweefden daar soms 's avonds voor de bijenkorven. Witte Struikhei heb ik in deze vakantie op tal van plaatsen gezien, bij het drogen worden de bloempjes echter weer licht-roodkleurig, dat is ook het geval met die u mij zondt. Dank voor de Clethra. T.