

gebied door verschillende vogelsoorten? Ik wil hier niet spreken van den grooten gelen Kwikstaart in Limburg en in den Achterhoek, want ik acht het best mogelijk, dat die daar van ouds al broedt, maar tot nu toe onopgemerkt bleef. Maar met den zwarten specht is dat toch anders, en met de Europeesche kanarie in de Rijnprovincie ook. De nachtegaal is zich nieuw komen vestigen op Texel, de Eiderend heeft het geprobeerd op Vlieland, de Middelste Zager op de Noord-Westplaat. Op diezelfde Plaat verwacht ik ook binnenkort de eerste graspiepers. Toen er jaren geleden nestkastjes in Artis werden opgehangen kwam er zich de kleine Bonte Specht vestigen; zoodra een boschje in het Vondelpark deugde, verscheen er de Nachtegaal. Nestkastjes en drinkgelegenheden hebben op menige plaats nieuwe vogelsoorten aangelokt en weten te behouden, zoodat ik altijd nog iedereen durf aan te raden »terreinen in te richten, om nieuwe vogelsoorten te bekomen«. Misschien wil de heer Wolda zijn standpunt in dezen nog eens toelichten.

Intusschen blijf ik hem dankbaar voor zijn werkelijk bewonderenswaardige Studies en ook het Departement van Landbouw mag geprezen worden, om het tot stand brengen van deze uitgave.

JAC. P. THIJSSÉ.

De Koekoek ei-eter. — In »The Ibis« van Juli 1918 vind ik hieromtrent het volgende: »Wij vonden een nest van den Gelen kwikstaart op 15 Mei en nog drie andere, waarvan de eieren waren uitgezogen. Een dag of twee later betrapte mijn vriend een koekoek op heeterdaad bij een kwikstaart-nest, waarin de eieren pas gebroken en gedeeltelijk leeg gezogen waren. Hij schoot den koekoek en later werd er op hetzelfde perceel nog een geschoten koekoek gevonden. Ook troffen we uitgezogen eieren aan van rietgors en patrijs. Het is moeilijk te gelooven, dat een vogel met een snavel als de koekoek patrijzen-eieren kan stuk pikken, maar omtrent die van de kwikstaartjes bestaat niet de minste twijfel«.

T.

De Nachtegaal op Texel. — In 1915 werd de nachtegaal voor 't eerst op Texel waargenomen n. l. in het Doolhof.

In Augustus 1916 vond ondergeteekende een leeg nest van 't dier al laar, maar trof hem niet aan. 26 Mei 1917 vond Jan P. Strijbos op denzelfden plek een leeg nest, maar nam den vogel niet waar.

Dit laatste gebeurde echter op 10 Juni 1917 door den Heer Thijssé en als laatste feit vond ik 9 Juni 1918 weer op denzelfden plek weer een leeg nest. (mijn verhaal wordt eentonig!) Nachttegaallid niet gehoord op 9 en 10 Juni.

»Broedend geconstateerd« is de vogel dus eigenlijk nog niet, al rekenen we in ons hart *Luscinia* nu ook tot de Texelsche broedvogels. Misschien weten de nestjesuithalende boerenjongens uit de buurt daar meer van de nachtegaal-eitjes, hoewel dit laatste nest wondergoed verstoppt zat. Kan iemand ons nog verder gegevens verschaffen?

L. V. 'T SANT.

De Hazelworm in Drente. — In aansluiting met het bericht van den heer H. J. Venema in »De Levende Natuur« van 1 October j.l. over hazelwormen in Drente kan ik mededeelen, dat ik voor eenige jaren er een gezien heb in het stadsbosch te Assen.

Winschoten.

W. W. SCHIPPER.

Uit Twente. — Op Twickel bij Delden is het nest van een *Havik* uitgehaald met 4 eieren en de ouden zijn doodgeschoten.

In Wiene bij Delden is dit voorjaar een vaal Stormvogeltje geschoten.

Denekamp.

BERNINK.

Vroege Trekkers. — Vrijdag 30 Aug. nam ik in den polder bij Nijkerk 10 wilde ganzen waar. Toen ik ze naderde, vlogen ze op een afstand van circa 20 meter op en verdwenen in de richting Harderwijk. Ook hebben we Zondagmiddag 24 Aug. op de heide alhier tweemaal een zwerm lijsters gezien. Ze waren grooter als merel en lijster, maar door den afstand konden we de kleur niet goed zien. Is het mogelijk dat het kramsvogels waren?

Kampen.

C. G. B. TEN KATE.

Kleine Vliegenvanger? — Hedenmorgen zag ik in het stadsplantsoen hier ter plaatse een vliegenvangertje iets kleiner dan de grauwe. Ik heb hem wel een kwartier lang met mijn kijker kunnen volgen. Een oogenblik kwam het vlak bij me te zitten en ook viel het licht er goed op. Toen zag ik tot mijn verwondering, dat de keel roodachtig was en dacht ik dadelijk aan een roodborstje. Nu las ik in Brehm, dat er een klein vliegenvangertje bestaat, dat een roode keel heeft, evenals een roodborstje en dat dat hier een enkelen keer is waargenomen. Hetzelfde las ik ook in Kurt Flöricke's »Vögel des deutschen Waldes«; ook de verdere beschrijving komt goed uit.

Kampen.

C. G. B. TEN KATE.