

volkomen stankvrij. De stinkende pad beweegt zich niet zoo onbeholpen als z'n zusje of broertje, de gewone pad, maar loopt hoog op zijn pooten, vrij snel, zoodat je hem, op het eerste gezicht, wanneer het donker is, voor een muis houdt.

En ten slotte nog mijn ringslang.

Reeds vroeger had ik al ringslangen in een terrarium gehouden, maar toen ik deze kreeg, had ik geen ruimte beschikbaar; ik heb hem toen los laten loopen in den tuin en dit ging in 't begin goed.

Den eersten dag dat ik hem in mijn tuin had, at hij één van mijn stinkende padden op en dit heb ik haar maar half vergeven; ik had trouwens in verschillende boeken gelezen, dat de ringslang wel graag kikkers eet, maar geen padden; en hoewel er voldoende kikkers rondsprongen, vergreep hij zich toch aan een pad. Ik merkte dit 's avonds; ik pakte hem op zonder te zien dat hij juist gegeten had en toen gooide hij, zooals bij die dieren gewoonte is, zijn boutje er uit, en daarin heb ik mijn stinkende pad herkend. Gewoonlijk iederen dag dat de zon scheen, kon ik mijn ringslang vinden, anders bleef zij maar liever verborgen, maar soms zag ik haar ook op zonnige dagen niet, dan maakte zij waarschijnlijk uitstapjes naar de burens, maar zij kwam geregeld terug. Zoo'n uitstapje heeft haar ten slotte het leven gekost, want op een goeden dag vertelde onze meid, dat de meid van de burens haar verteld had, dat ze daar in den tuin een adder hadden doodgeslagen en ik begreep dat dat mijn ringslang was. Zijn tragisch einde heeft een diepen indruk op mij gemaakt, zoo diep zelfs dat ik het besluit heb genomen, om nooit meer dieren los te laten loopen, die over een heining kunnen klimmen.

Zoo is het gegaan met mijn dieren, die ik als 't ware in vrijheid heb bestudeerd en ik raad U aan »laat ook kikkers los loopen in Uw tuin en dan zult gij veel aardigs zien en Uw planten zullen er wel bij varen. Want de hoeveelheid muggen, vliegen en andere insecten, die zij opeten, is verbazend groot. Zoo hadden wij een boschje lintgras en dit krioelde van de muggen; maar zoodra ik kikkers in mijn tuin had, was dat boschje mugvrij. De ringslang is niet nuttig, want zijn hoofdvoedsel bestaat uit kikvorschen en kleine visschen, maar zij komen niet in zoo groote getale voor, dat zij merkbaar schade aanrichten.

Rotterdam.

G. A. E. VAN DEN BERG.

DE VOGELS, DIE BROEDEN OP NOORD-BEVELAND.



LAARNE wil ik aan het verzoek voldoen, op te geven welke vogels er op Noord-Beveland broeden.

Vóór ik hiermee begin, wil ik even een kleine beschrijving van dit bij uitstek vruchtbaar landbouw-eiland geven. 't Bestaat uit een massa polders, zeer vele dijken zijn er dan ook. Vlak is het dus heelemaal niet. Aan den Zuidkant wordt het omringd door een breeden zoom van schorren, in 't Westen gaan deze over in een zeer merkwaardige duinenreeks, waar veel eendvogels broeden; en in 't Noorden is het een sterke zeedijk met slikken, aan welks binnenkant 'zich verscheidene dijkkinlagen of, zooals ze bij ons op N.-Beveland zeggen, „kuipen” bevinden, die het eiland beschermen tegen de Ooster-Schelde. Over het algemeen staan er op het eiland weinig boomen, alleen op de dijken, die meest beplant zijn met iepen, esschen, peppels en knotwilgen. Betrekkelijk weinig weiland is er. Alle grond is bouwland. Geen stukje grond is er te vinden, dat bepaald minderwaardig is te noemen. Ook de boerderijen, die alle 60—100 H.A. groot zijn, zijn meestal zelf door een paar weiden omgeven, waarin meestal iepen of knotwilgen staan.

In bovengenoemde dijkkinlagen, dezelfde die men op het eiland Schouwen aan den Zuidkant vindt tusschen Zierikzee en Burgh, bevinden zich groote rietputten, waarin zich een rijk

vogellevens afspeelt en waarin ook een massa planten van allerlei soort groeien. Evenals op Schouwen zijn deze putten zeer rijk aan paling. In deze putten huizen natuurlijk bij massa's meerkoeten, wilde eenden, dodaarsen, karkieten en waterhoentjes. Ook een enkele stern is er door mij broedende aangetroffen. Doch daar de putten niet zoo groot zijn als op Schouwen en er zich ook geen eilandjes in bevinden, blijven de sterns liever aan den overkant van de Ooster-Schelde.

Verder naar 't Westen heeft men den ingelooopen Sophiapolder, waar zich op 't oogenblik een heele zanding voor heeft gevormd, waarop zeer vele sterns, strandpleviertjes en tureluurs broeden. Over de duinen heb ik reeds een enkel woord gezegd. 'k Zal nu dadelijk een lijstje geven van alle vogels, die door mij broedend op 't eiland zijn aangetroffen. Enkele komen er slechts zeldzaam voor, andere zeer menigvuldig. Over 't algemeen is ons eiland rijk aan vogels.

't Volgende lijstje heb ik opgemaakt:

Zwarte Kraai. Niet veel broedend op ons eiland. 's Winters en in 't najaar ziet men ze met de bonte kraaien in heele zwermen rondtrekken van 't eene stuk land naar 't andere en ook aan den zeekant zijn ze te vinden. De zeedijkbermen liggen als bezaaid met stukgeworpen mosselschelpen.

Ekster. Deze vogel is een hooge zeldzaamheid op Noord-Brabant. Deze is door de jachttopzieners totaal uitgeroeid.

Wielewaal. Enkele worden daarvan in iepen jaarlijks broedend aangetroffen.

Spreeuw. Bij massa's. In den aardbeien- en bessentijd moeten alle struiken met groote netten tegen hun vraatzucht beschermd worden.

Vink. Veel in de meidoorns en appelboomen.

Kneutje. In de struiken langs den weg.

Huismsch. Zeer vele.

Ringmsch. In de knotwilgen.

Rietgors. In de rietputten.

Geelgors.

Veldleeuwerik. } Zeer veel aan de slootkanten.

Kuifleeuwerik. }

Witte Kwikstaart. } In de weiden.

Gele Kwikstaart. }

Graspieper. Zeer vele in weiden en langs slootkanten.

Duinpieper. Een heel enkele in de duinen.

Boomkruipertje. } Broedplaats bekend ver-

Boomklevertje. } ondersteld.

Koolmees. Dit vogeltje verschijnt hoe langer hoe meer.

Winterkoninkje. Veel.

Bastaardnachtegaal. In schuren en houtstapels.

Grasmusch. }

Braamsluiper. } Broedplaats bekend.

Tuinfluitier. }

Rietzanger. }

Kleine Karkiet. } In de rietputten.

Groote Karkiet. }

Merel. Geweldig veel in heggen en knotwilgen.

Zanglijster. Tamelijk veel in heggen en knotwilgen.

Roodborstje. }

Roodstaartje. } Niet veel voorkomend.

Grauwe Vliegenvanger. Zeldzaam.

Boerenzwaluw. } Zeer algemeen aan en in

Huiswaluw. } de schuren.

Koekoek. Zeer algemeen. Veel in nestjes van graspiepers.

Steenuil. Vrij algemeen. Broedt in holle knotwilgen.

Kerkuil. Een heel enkele broedende gevonden in oude schuur.

Torenvalk. Enkele. Meestal broedend in knotwilgen.

Woudduif. Zeer algemeen.

Tortelduif. Vrij algemeen.

Patrijs. Niet zooveel als in de andere Zeeuwsche eilanden.

Kwartel. Niet veel voorkomend. Dit jaar echter heb ik er veel gehoord.

Blauwe Reiger. Eén enkele broedkolonie. Overigens veel voorkomend.

Waterhoentje. } Zeer algemeen.

Meerkoet. }

Scholekster. Vrij veel in de duinen en aan den Noordkant.

Kievit. Broedt weinig op N.-B., doch komt vooral op den trek in groote zwermen ons eiland bezoeken.

Strandplevier. Deze heb ik veel op 't strand en in de duinen gevonden.

Kluit. Eén kolonie is door mij op het grasveld tusschen den zeedijk en de duinen gevonden.

Tureluur. Enkele nesten worden hiervan op de schorren gevonden.

Groote Stern. }

Vischdiefje. } In de duinen en op 't strand

Dwerg Slern. }

Wilde Eend. Zeer algemeen aan slootkanten en in knotwilgen

Zomertaling. Eén heel enkele is door mij in een dijkkinlaag gevonden.

Dodaars. Vrij veel in de rietputten der dijkkinlagen.

Bergeend. Een enkele in de duinen.

Ziehier de lijst van de vogels, die op ons eiland broedend zijn aangetroffen. Natuurlijk kan men hier 't heele jaar door aan den zeekant zilvermeeuwen, meeuwen en mantelmeeuwen zien en ook de bekende aalscholvers, vooral in de Zandkreek. 's Winters en in 't najaar ijsvogeltjes en snippen.

Wel eigenaardig is het, dat, hoewel Schouwen zoo dichtbij ligt, vele daar broedende vogels niet broeden en soms zelfs totaal niet in N.-Beveland gezien worden. Zoo b.v. heb ik op ons eiland nog nooit een Grutto gezien, terwijl deze toch op Schouwen vrij algemeen voorkomt. Dat eiland is dan ook het eiland bij uitnemendheid voor de vogels.

Middelburg.

M. W. VAN ARENTHALS.

IN EEN TUIN BIJ DEN HAAG.



ET vorige jaar heb ik een lijstje gestuurd van de broedvogels, die ik in onzen tuin had waargenomen. Hiernevens vindt u weer een lijst, waarop ge kunt zien, dat het aantal nesten en broedvogels belangrijk uitgebreid is. Wat de laatste betreft is de uitbreiding beperkt tot Pimpel, Tuinfluiter en Boomkruiper. Het aantal merelnesten is schrikbarend toegenomen. Als het tenminste het volgende jaar naar evenredigheid toeneemt, zullen we er een stokje voor moeten steken. Dit jaar hadden we al veel meer last van de merels, hoe zal het dan het volgende niet zijn? Twee van de merelnesten, die ik onder »uitgehaald« heb gezet, hooren daar feitelijk niet thuis. Dat komt, omdat het zoowat de eerste nesten waren. Er was nog geen struik bebladerd en daarom had een van de vogels een plaats uitgezocht in gekuilde eikjes en de andere in gekuilde beukjes. Toen die struiken weggehaald werden, hebben we de nesten in andere, daar dichtbij gelegd. Maar hoewel in beide gevallen er reeds jongen in waren, hebben de oude het verlaten. Een ander merelpaartje had hun nest gebouwd in een laurier in een palmenkas. Ze kwamen er in en uit door de luchtopeningen. Van een ander merelnest, dat dicht bij het raam van onze huiskamer zat, heb ik eens de voedertijden waargenomen. Ik begon 10.12 's morgens. Op de volgende tijden kwamen de oude voer aandragen: 10.19, 10.25, 10.29, 10.36 en 10.42. Het voer bestond hoofdzakelijk uit wormen, die gewoon aan de jongen gegeven werden. Een maal echter zag ik, dat de jongen uit den krop gevoerd werden. Ik kon het heel duidelijk zien, daar het nest maar een meter of 20 van mij verwijderd was en ik door een kijker alle details kon onderscheiden.

Een jong stak z'n kop half in den bek van den oude en dan gaf deze voer, precies als een duif. Ik wist niet, dat dat voorkwam.

Met een vliegenvanger heb ik ook iets leuks beleefd. Er had n.l. een winterkoninkje een nest gebouwd tegen den stam van een grooten kastanje tusschen uitloopers \pm 50 cM. boven den grond. Nadat hij er eitjes in gelegd had, verliet hij het. Ik liet het nestje zitten en maar goed ook, want na een week loop ik langs den bewusten boom, toen er tusschen dezelfde uitloopers een vliegenvangertje weg vliegt.

Ik kijk eens en jawel hoor, daar had zoo'n grauwtje z'n nest gebouwd boven op den ronden kogel en het er vast in geregen. Er lag een ei in en daarom ging ik ook maar gauw weg. Een paar dagen later merkte ik, dat er 2 eitjes in het nest waren en de vogel het verlaten had. Ik heb toen beide nesten, die èèn geheel vormden, er uitgehaald en de eitjes uitgeblazen, zoodat ik het kon bewaren. Verder hebben een ander vliegenvangertje en een merel een vreeselijke luie manier gehad. Toen ze hun eerste broedsel groot gebracht hadden, ging het wijfje weer dapper aan het eieren leggen en broeden in hetzelfde nest. De merel is toen uitgehaald, maar 't vliegenvangertje is uitgevlogen. Ik had dit nog nooit waargenomen. Het