

Bandvorming bij weegbree. — Enkele dagen geleden vond ik bij Noordbroek op een wegbarm een interessante fasciatie van een weegbreeplant. Daar ik meen, dat bandvorming bij weegbree niet zoo heel veel voorkomt, maakte ik er een foto van, en zend U die hierbij toe.


Behalve de bandvorming is nog interessant de verbazende lengte van den stengel ± 60 c.M. In de onmiddellijke nabijheid van het vergroeide exemplaar vond ik ook nog enkele reuzenvormen, waarvan ik er een ook op de foto afbeeldde (alleen de aar, de stengel onder de aar was ongeveer even lang). Ter vergelijking zette ik rechts op de foto een drietal normale weegbrestengels van ± 20 c.M. en onderaan een centimetermaat, waarvan twee leden van 10 c.M. zichtbaar zijn. U kunt daarmee de grooten ongeveer nagaan.

Op den vergroeiden stengel bevindt zich normaal zaad.

De planten groeiden aan den voet van een hoop bazaltslag, (kan daar soms eenige meststof door den regen uitgelooft zijn, die invloed op den abnormalen groei van die reuzenstengels uitoefende? op andere plaatsen vond ik ook wel de planten onmiddellijk om de bazalthoopen forscher dan elders op de bermen, maar dat zou m. i. ook wel kunnen zijn, doordat 't gras tusschen de hoopen geoogst is en de planten vlak om de steenhoopen dus rustiger staan.)

Winschoten.

K. M. SILLEVIS.



Bandvorming bij Weegbree.

Kuifleeuwerik te Amsterdam. — Het is nu reeds de tweede winter, dat ik 's morgens en 's middags, de Pretoriusstraat alhier passerende, een viertal kuifleeuwerikken opmerk, meestal alleen, doch ook wel in gezelschap van eenige ordinaire musschen. Zij hebben zich blijkbaar al aardig aan het tamelijk drukke verkeer aangepast en zijn heel weinig schuw, dikwijls kan ik de mooigeteekende diertjes tot op 1 Meter afstand naderen voordat ze wegtrippelen. Dezen winter zag ik ze reeds van half November af en denk ze tot eind Februari op mijn dagelijksche wandelingen te zullen ontmoeten.

Amsterdam.

JUL. A. VISSER.

AANGEBODEN:

Een prachtige collectie van Nederlandsche Insecten: Totaal 6 »Merkelbach«-doozen 40×30 20 part. gemaakte doozen 31×38 met blauw linnen. Hiervan zijn 1 doos loopkevers ± 50 soorten in totaal 500 stuks w. o. *Carabus auronitens*, *Car. nitens*, *Agonum sexpunctatum*, *Panagaeus crux major* L., *Elaphrus uliginosus*, *Cicindela maritima* enz. 1 doos waterkevers ± 30 soorten, in totaal 220 stuks w. o. *Dytiscus latissimus*, *Cybister laterali-marginalis* e. a. 1 doos kortschilden ± 40 soorten bijna 200 stuks w. o. *staph. erythropterus* enz. aaskevers verder 11 soorten w. o. *silpha atrata* (6 $\times$), *s. carinata* (1 $\times$), *s. tristis* enz. totaal 60 expl. 1 doos doodgravers 4 soorten (16 stuks) w. o. *Necr. germanicus* enz. *Hydrophilus*. Veel soorten ± 60 stuks. 1 doos »Haantjes« ± 50 soorten, ± 200 stuks w. o. de »Reuzenhaan« *Timarcha tenebricosa*, *Chrys. graminis*, *staphylea melasoma tremulae* *Galeruca tanaceti* Lin. enz. »Lieve Heersbeestje« 17 soorten in totaal 85 stuks. 1 doos Boktorren pracht-serie ± 25