

Wintervogels. — Ook ik nam hier in Amsterdam verscheidene troepjes Vlaamsche gaaien waar. Vandaag zag ik in den tuin 2 goudhaantjes. Ondanks de sneeuw zijn de spreeuwen, die anders met de eerste koude vlogen hierheen komen, nog niet gezien.

Amsterdam.

G. KALFF.

Winterleven. — Dinsdag 13 Dec. '19 zag ik verscheiden vleermuizen vliegen. Een mere! floot helder.

Middelburg.

J. ZIJLSTRA.

Vroeg. — Ik heb gisteren, 18 Januari, reeds een vleermuis zien fladderen, en daar mij dat erg vroeg toeschijnt, wilde ik er even melding van maken.

Meppel, 19 Januari 1920.

MEIJER KAN.

Corrigenda betreffende „iets over geslachtsbepaling“. — Bladzijde. 175, regel 3 van boven, staat: invloed, lees: invloed; regel 10 van boven, staat: kerven, lees: kernen. Bldz 176, regel 9 van boven, staat: waarbij alle kiemcellen, lees: waarbij de kiemcellen. Bldz. 208, onderste alinea, is een regel uitgevallen. Er moet staan: Maar bij de zgn. „rijpingsdeelingen“ der kiemcellen worden de chromosomen — we zullen hier niet in bijzonderheden treden; het proces is in werkelijkheid wat ingewikkelder — niet door middengedeeld, maar krijgt ieder der beide dochtercellen, welke ontstaan bij de eerste der twee op elkaar volgende deelingen (de zgn. „reductie-deeling“), de helft... Bldz. 240, regel 3 van boven, staat: het ♀ √, lees ♀ √ (Grieksche n). De 2e vergelijking moet zijn: ♀ cel ($\frac{a}{2}$, waarin ν) + ♂ cel ($\frac{a}{2}$, waarin μ) = ♂ individu (d, waarin ν en μ).

De heer J. ten Hagen, te Amsterdam, maakte mij op het volgende nog opmerkzaam, waarvoor ik hem ten zeerste dank:

Blz. 236, regel 1 van boven staat: *Bryonia alba* is tweeslachtig, *Br. dioica* echter eenhuizig. Lees: *Bryonia alba* is eenhuizig, *Br. dioica* echter tweehuizig.

Van regel 17 af wordt het dan: Beschouwen we bv. Correns' kruisingen tusschen de bovengenoemde *Bryonia*-soorten. Het eindresultaat was: bestuift men de eenhuizige plant (*Bryonia alba* in dit geval) met het stuifmeel van de tweehuizige (*Br. dioica*), dan blijken de bastaarden uitsluitend ♀♀ te zijn.

Waar we weten, dat de geslachtstendenz hier van de eenhuizige plant (*Br. alba*) afkomstig moet zijn, en dat hiervan de ♀ kiemcellen, de eicellen, gebruikt zijn, kunnen we besluiten, dat de eicellen alle ♀ tendenz bezitten. Bestuift men daarentegen de tweehuizige plant met het stuifmeel (de ♂ cellen) van de eenhuizige, dan verkrijgt men voor de helft ♂, voor de andere helft ♀ bastaarden.

J. HOFKER.

GEVRAAGD:

De Levende Natuur, jaargang I tot XX, door A. L. Bosch, v. Bleiswijkstr. 47, Den Haag.

Aflevering 13 van den een-en-twintigsten jaargang van *De Levende Natuur*, J. Zijlstra, Rouaansche Kade G 122, Middelburg.

»Reiter« Fauna. Germanica Käfer, deel I, II en III. J. L. van Laer Jr., v. Hasseltlaan 9, Apeldoorn.

AANGEBOODEN:

A. Voigt, Unsere Singvögel (met gekl. platen, 186 blz.) f 0.50; P. F. F. Schütz, Unsere Zierpflanzen (met gekl. platen, 215 blz.) f 2.— (Biologie v. d. meest voorkomende gekw. planten); T. Zahn, Gartenlust und leben (met afbn., 158 blz.) f 0.50; Kerner v. Marilaun, Het leven der planten, 4 dln., voor elk bod van af f 10.—; Graebner, Lehrbuch der allgemeinen Pflanzengeographie (300 blz. met 150 afb.) f 2.50. Vracht voor koopers. Alles ingoeden staat en gebonden. Adres: De Koning, Lochem, de Bleek A 276.

De Levende Natuur, Jaarg. 18, 19, 20, 21, 22 en 23 geb.; Plankk Verner von Marilaun, 4 deelen, prachtband; Seitz, Die Grosz schmetterlinge Europa etc.; Reiter, Fauna Germanica; Everts, Coleoptera Neerlandica en verder nog vele andere boeken, alle in prachtband, op 't gebied der Natuurlijke Historie. Adres: M. A. B. Toxopaeus, Beerta, prov. Groningen.

CORRESPONDENTIE.

L. K. te A. Dat u in 't Vondelpark tweemaal en in Artis driemaal den boomklever waargenomen hebt, is zeker de vermelding waard. In de Watergraafsmeer heb ik hem vroeger in de Stadskweekerij ook wel gezien. Op Nieuwjaarsmorgen zag ik twee ijsvogels achterin het Vondelpark, nabij den Berg, en daar zaten ook koperwieken te zingen. Die zwartgrijze meeuwen zijn jonge stormmeeuwjes.

T.