

- Alectorolophus hirsutus f. leucodon*. Eys (H., J., K., Si.).
Alectorolophus minor f. vittulatus. Eys (H., J., K., Si.).
Euphrasia montana. Cottesen (H., J., K., Si.).
Melissa officinalis. Iepenoord bij Oostkapelle verw. (Si.).
Dracocephalus parviflorus. Weert aang. (H., J., K., V. in N. K. A. 1918).
Lamium purpureum albiflorum. Nuth (de W.), Maastricht (J. Pagnier).
Lamium maculatum met witte middenstreep op de bladeren. Terrein waterl. Heemstede (G. D. Swanenburg de Veije).
Lamium maculatum fl. alb. Ooische waard bij Nijmegen (Un.).
Lamium maculatum fl. ros. Ooische waard bij Nijmegen (Un.).
Stachys arvensis fl. alb. Malden—Overasselt (Un.).
Stachys germanicus en *italicus*. Weert aang. (H., J., K., V. in N. K. A. 1918).
Leonurus Cardiaea var. *villosus*. Vrouwepolder (Si.).
Teucrium Chamaedrys. Dainen Vogelenzang (G. D. Swanenburg de Veije).
Plantago aristata. Amsterdam (Sutherland).
Petasites albus. Westbroek (A. C. den Besten).
Aster longifolius. Karelke by Weert (H., J., K., V. in N. K. A. 1918).
Inula Helenium. Scherpier bij Schoondijke (Si.).
Xanthium spinosum. Schiedam (W. F. Dorgelo).
Ambrosia trifida met de var. *integrifolia*. Rotterdam (K.).
Galinsoga parviflora. Soest (veel) (W. J. C. Kooper), Terborg (B. G. Meijeman), Apeldoorn (A. G. Kerkhoven—Wijthoff).
Bidens pilosus. Wormerveer 1918. (K.).
Grindelia squarrosa. Rotterdam 1918. (K.).
Chrysanthemum Leucanthemum discoideum. Scheveningen (So.).
Carduus hamulosus en *acanthoides*. Weert aang. (K.).
Carthamus lanatus. Amstenrade (de W.).
Chondrilla juncea. Weert 1918. (H., J., K., V.), Nijmegen (K.).

H. HEUKELS.

Nieuws uit Ons Krijtland. — Hoewel Carboon in den hollen weg naar de Terzieter beek voor den zorgvuldigen speurder nog wel te ontdekken valt, is juist door den aanleg van den nieuwen weg een beter profiel zichtbaar geworden, en wel een 20 M. voorbij de Sijler-Terzieterbeek, vlak aan den ondiepen slootkant.

Bij het Onderste Bosch schijnt de voorraad Belemnieten tamelijk uitgeput te zijn. Daarentegen ontdekte ik links van den weg naar de Eperhei, op twee derde van de helling een kleine grintgroeve, waarbij een vierkante meter groot vlak van het Krijt was blootgelegd. Hieruit beitelde ik in eenige uren behalve Brachiopoden en een paar haaletanden, een 25-tal Belemnieten.

Door de ontginning van een mergelgroeve op den St. Pieterberg, is er op 't oogenblik een prachtige ontsluiting te zien, namelijk de uitgeschuurde krijtbodem van de tertiaire zee. Over een aanzienlijke oppervlakte is het tertiaire groenzand en de klei verwijderd door de arbeiders. De zeebodem is daardoor blootgekomen en is hobbelig als een weide vol groote molshoopen. Die molshoepachtige krijtheuveltjes dragen een cM. dikke verweeringskorst, die bruin gekleurd is. Op den bodem van de zee liggen nog overal zwarte gerolde vuursteentjes. Wie in de gelegenheid is, dit waar te nemen, verzuime het niet.

Ten slotte dient nog gemeld te worden, dat ik wandelende van Epen naar Eijs op 9: October l.l. nog een 30-tal bloeiende planten aantrof.

»Natura Docet».

BERNINK.

De duingronden van de Amsterdamsche Waterleiding. — „Naar ik verneem, worden door de Directie van de Amsterdamsche gemeentelijke waterleiding geen kaarten meer uitgereikt voor de paden in haar duinen, wel echter nog voor de straatwegen langs de leidingkanalen, welke kaarten voor vogelwaarnemers van weinig nut zijn. Dit besluit, waarschijnlijk genomen tot meer afdoende bescherming der broedende vogels, hebben we zeker niet het minst te danken aan de vele klachten, welke in den zomer 1919 binnenkwamen, over te grooten ijver van vogelwaarnemers. Nu kan niemand, met welke kaarten ook, het duin meer betreden.

Amsterdam.

G. KALFF.

Gentiana Cruciata. — In verband met het bericht in het Novembernummer van *D. L. N.* deel ik U mede, dat op een helling, vlak bij Katwijk a/Z. de Kruisblad-Gentiaan (*Gentiana cruciata*), tamelijk veel groeide. *Orobancha purpurea* of Blauwe Bremraap heb ik daar ook tweemaal gevonden.

J. KETE'AAR.