

- Galinsoga parviflora*. Bussum (Si.), Ooische waard, Weurt (Ke. en R.), Soest (1917, J. Koornneef), Soestdijk (St.), den Dolder (J. D. Dorgelo).
Hemizonia pungens. Weert (N. K. A. 1919 p. 99. Ver Straeten).
Calliopsis tinctoria. Weert (Kl.).
Matricaria discoidea. Utrecht, den Haag (St.).
Chrysanthemum Leucanthemum var. *discoideum*. Vaals (H. Kemp).
 „ *macrophyllum*. Verwilderd. Hulsberg, Wijnandsrade, Kerkrade (de W.).
 „ *vulgare* met petroleumgeur. Spanbeek (de W.).
Lappa minor fl. alb. Ter Apel (Un. 1920).
Centaurea Scabiosa albiflora. Eis-Wittem (de W.).
 „ *melitensis* var. *Apula*. Deventer (Kl.).
Lactuca saligna. Ooische waard, Weurt (Ke. en R.).
 „ *Scariola*. Weurtsche waard en ruigte aan den Weurtschen weg (Ke. en R.), Nijmegen (Ooi) (F. W. Went).
Sonchus arvensis uliginosus. Bergen-Egmond (Kl.) (in de zeeduinen algemeen).
Crepis setosa. Deventer (Kl.).
 „ *taraxacifolia*. Zwijndrecht (Kl.).
Hieracium aurantiacum. Aan spoorbaan Leeuwarden-Tjietjerk (A. S. C. Schweers).
 H. HEUKELS.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Raadselachtige Ringer. — Gedurende de laatste maanden werden door mij vele kleine zangvogels gevangen en na geringd te zijn, direct in vrijheid gesteld. (Ringproeven voor 's Rijks Museum te Leiden).

Onder deze vogels waren verscheidene koolmeezen en daaronder bevonden zich exemplaren reeds voorzien van een nummer (o. a. No. 3—6—11—17—23) zonder verdere aanduiding van herkomst.

De constructie en het aanleggen der ringen lieten meerendeels te wenschen over, en het ware zaak om den onbekenden ringer daar opmerkzaam op te maken.

Reden, waarom ik hierbij uwe tusschenkomst inroep om bijv. in de „vragenrubriek” de onbekende ringer in de gelegenheid te stellen zich bij U bekend te maken, opdat hij bovendien daardoor in de gelegenheid komt, om de tijdelijke verblijfplaats van zijn geringde exemplaren te weten te komen. Dat zal hem, dunkt mij, toch boven alles interesseren.

's-Gravenhage, 257 Bezuidenhout.

W. A. M. JANSSEN.

Merelonderzoek in 1921. — Op dezelfde wijze als in '20 vraagt ondergetekende ook in '21 medewerking voor bovengenoemd onderzoek. De grens voor de huis-merels wordt echter tot 70 M. (= 100 pas) van onze woningen uitgezet.

Bovendien vraagt hij — ter vergelijking — opgaven omtrent dezelfde verschijnselen bij Zanglijster en Vink. Ook deze dus te onderscheiden in bewoners van buiten- en huisdomicilies.

Van belang schijnt nu vooral het aantal eieren van het volle legsel.

Het opzenden van dode vogels met opgave van hun vermoedelijk domicilie is aan te bevelen. Bovendien opgave van mogelijke kleurafwijkingen.

G. NOLDA.

Dit onderzoek wordt met dat van den heer TOLLENAAR gecombineerd. Opzending van waarnemingen kan aan beide adressen geschieden. Aldaar zijn ook nadere inlichtingen te verkrijgen.