

**Pestvogels.** — In Bloemendaal vertoonden zich in de tweede week van Januari troepjes pestvogels, één van drie en een van zeven, zwerfend langs de rozenhagen in het Park en op Duin en Daal. Het troepje van drie kwam in mijn tuin op een groote honds-rozenstruik die haast ieder jaar door pestvogels bezocht wordt. De groote troep werd ook gesig-naleerd door onze dorpspolitie, die hier wakker voor de vogels opkomt. T.

**Vleermuizencultuur.** — Als antwoord op de vraag in D. L. N. gedaan, hoe men vleermuizen lokt, kan ik U mededeelen, dat men door nestkastjes voor de vogels op te hangen tevens de vleermuizen een goede schuilplaats verschaft. Zoowel in Wageningen als Alkmaar en Leiden wordt een deel, vooral in den winter, bezet door slapende vleermuizen. Ook onder dakpannen slapen ze. Ik vermoed echter dat de vleermuizen het *hangend* slapen prefereeren boven *liggend*, zoodat de torentjes met horizontale stangetjes, die in Texas gebruikt worden beter aan het doel beantwoorden dan de nestkastjes, waar ze als regel niet in kunnen hangen.

Men probeere anders eens ijzeren stangetjes aan te brengen in oude ongebruikte duivetillen, Wageningen. L. V. 'T SANT.

**De gevoelige paddestoelen.** — Waar de duinen andere jaren tot in November en December nog vrij wat paddenstoelen-soorten opleveren voor den Mycoloog, waren wij er in 1920 door de reeds in October optredende vrij felle vorst, zoowat geheel van verstoken.

Wat is nu het geval, nu we vele dagen lang in December en Januari zulke gietsbuien gehad hebben! Welnu de duinen vertoonen nu weer een rijken paddenstoelen groei en wel van de flora van de maanden *November* en *December*. Bij massa's de grauwbrown: *Clitocybe cyathiformis* Fr. de licht bruine hygrophane: *Tubaria muscorum* Fr.; de groengele naar jodoform riekende *Mycena* die zoo aardig staat tusschen het groene mos en waar wij den soortnaam nog altijd maar niet van te weten kunnen komen en nog andere soorten zooals: *humela rubra* DC. die er anders niet over denken om in de maand Januari zich te vertoonen. Waar ik zoo vast overtuigd was, dat iedere soort vrijwel, haar vasten tijd van verschijnen er op na hield, heeft die overtuiging door dit feit een gevoelige knak geleden. Nog te vermelden valt, dat van een onzer zeldzaamste Aardsterren soorten, de Geaster *mammosus* Fr. den 9en Januari een nieuwe vindplaats in ons land ontdekt is door de jeugdige nauwelijks zes jaar oud zijnde natuurliefhedder Tootje de Visser, uit Bloemendaal, gevonden dicht bij Bleekenberg, te Santpoort. Slechts op 2 plaatsen kwam zij tot dusverre voor, en wel achter Caprera bij Bloemendaal en op het „Keukenhof" te Lisse. Leiden. CATH. COOL.

**Ringmusch.** — Ik kan U mededeelen dat de ringmusch hier in den Achterhoek nog vrij veel voorkomt, achter Etten zelfs nog *heel* veel. In mijn tuin, hier in Terborg, waren er dezen zomer 2 paartjes, waarvan het eene tot  $3 \times$  toe in 't zelfde nestkastje broedde. Na een dagenlang gevecht met de koolmees om 't kastje, is de ringmusch overwinnaar gebleven. Eén paartje is den heelen winter blijven wonen in 't kastje. De laatste 2 jaren heb ik ze pas in den tuin opgemerkt, maar ik bezit den tuin pas 4 jaar. De eerste jaren waren er veel meer meezen, en ook boomklevers, die nu geheel ontbreken. Op het voederbakje aan het raam komen geregeld een stel koolmeezen, een man-vink en roodborst; ik geef ze o.a. fijngesneden kaas; koolmees en roodborst komen ook binnen, en de eerste gaat nu zelfs aan de ontbijttafel op het groote stuk kaas zitten, en pikt eruit. Misschien interesseert het U, welke vogels geregeld in den tuin komen? In de 2 laatste jaren: Wielewaal (in den bessentijd). Groenvink (broedde er beide jaren). Putter (tijdelijk, broedde in de buurt). Vink (broedde in den tuin). Witte kwikstaart, boomkruiper, koolmees en pimpelmees (broedden in nestkastje). Zwartkopmees, staart- en kuifmees en goudhaantje, sporadisch bij troepjes. Grauwe klauwier (broedde in tuin). Grauwe vliegenvanger (broedde in prieltje). Zwartgrauwe vliegenvanger (komt midden in den zomer een dag of veertien). Tjiftjaf. Fitis. Spotvogel en braamsluiper (broedden in den tuin). Zwartkopje (kwam van 't zomer voor het eerst). Tuinfluiter. Merel (broedde in den tuin). Groote lijster (dezen zomer voor 't eerst, een dag of 14). Zanglijster. Koperwiek (1 van 't winter, miste een poot). Nachtegaal. Roodborst. — Zwarte roodstaart (broedde in tuin). Heggemusche. Zwaluw, Winterkoning (broedde). Groote en kleine bonte specht komen 's winters sporadisch. Terborg. Mej. T. VERWEY.