

- Leonurus Cardiaca* var. *villosus*. Stat. terr. Woudenberg-Scherpenzeel. (S.), Scherpenzeel. 1920 (D.).  
*Ajuga reptans*. rood- en witbloemig. Wassenaar. (Kl.), lichtlila en donkerpaars. Heugen. (Kl.)  
*Orobanche pallidiflora* op *Geranium molle*. Bunnik. (W. Nieuwhof).  
*Aster parviflorus*. Zalt Bommel. 1920 (W. F. Dorgelo). Aan de Eem bij Baarn. 1920 (D.).  
 „ *Novi Belgii*. Den Dolder, Nijkerk verw. 1920 (D.).  
 „ *Tradescanti*. Werkendam. (Kl.).  
*Callistephus chinensis*. Beuningen (Ke. en R.).  
*Galinsoga parviflora*. Heemstede. (C. Sipkes).  
*Achillea Ptarmica* f. *angustissima*. Voorthuizen, Renswoude, Maarsbergen (S.).  
 „ *Millefolium B. collina*, 2. *pannonica*. Hollandsche Rading (S.).  
*Artemisia campestris* var. *sericea*. Nijmegen. (J. Kemp).  
*Carduus hamulosus*. Rijnouwen bij Utrecht. (S.).  
 „ *nutans albiflorus*. Hulsberg. (W.).  
*Helminthia echinoides*. Tusschen luzerne uit Provence. Putten (Vel.). (Dr. J. Th. Oudemans).  
*Lactuca Scariola*. Beuningsche waard. (Ke. en R.).  
*Xanthium italicum*(?) Amsterdam. (J.).  
 „ *spinosum*. West Knollendam. (Kl.).  
*Hieracium aurantiacum*. Wassenaar. (N. Meihuizen).  
 „ *umbellatum* f. *uniflora*. Bergen aan Zee (S.).

H. HEUKELS.

---

## VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

**Vischjesregen.** — Het in „Vragen en mededeelingen” van „De Levende Natuur” van November l.l. voorkomende over „Snoekenregen?”, geeft mij aanleiding U het navolgende mede te deelen:

De herinnering aan een gelijksoortig verschijnsel is mij sedert mijne kinderjaren bijgebleven, van welk verschijnsel ik nimmer de verklaring heb kunnen vinden.

Het betrof toen wel geen echte snoekjes, zooals ik er later wel uit de slooten opvischte en in mijn aquarium hield, doch zilvervisjes, speldevisjes, ter grootte van 1 à 2 c.M., dik plm.  $\pm 1\frac{1}{2}$  m.M., die ik in den zomer na zware donderbuien met stortregens in de karsporen op straat vond. Het geleken langgerekte harinkjes. Het was en is mij altijd een raadsel gebleven, hoe die goed levende vischjes in die plassen konden geraken, aangezien deze geenerlei verbinding hadden met grootere waters of slooten, ja wel een Meter, of meer zelfs, hooger lagen dan het niveau van een op tien of twintig Meters afstand gelegen vijver, zoodat ze niet uit dezen naar de karsporen gespoeld konden zijn. Die vischjes waren zwakke, teere wezentjes, want als men ze, frisch en wel, een paar minuten in de warme hand had gehouden, werden ze al flauw en stierven. Voorzichtig in een flesch geschept, bleven ze wel een paar dagen in leven.

Zeist.

J. B. M. v. GALEN.

**Sterfte onder de kerkuilen in Groningen.** — Er moet onder de kerkuilen in het noorden des lands plotseling een verschrikkelijke sterfte zijn opgetreden. Van alle kanten bereiken ons berichten van dood in 't land gevonden uilen. Ik zelf kreeg in 14 dagen reeds 32 stuks ter prepareering opgezonden, mijn broer 25 stuks en van andere kennissen hoorden wij ook zulke getallen. Alle voorwerpen zijn broodmager en hun buikholte is opgevuld met een gele vloeistof. Hongersnood tengevolge van de vorst kan de oorzaak niet zijn, want rondom de groote boerderijen is voor een kerkuil altijd nog wel wat te vinden en juist ook op die plaatsen vindt men de trouw aanwezige uilen nu dood. Blijkbaar is de vogelcholera op hen overgeslagen.

A. A. VAN VOORN.