

zekerd. In het slib van zoo'n opgedroogde vindplaats kan men dan soms zeer mooi bewaarde „half fossiele” exemplaren terugvinden van de kieuwpootkreeft, wat een aanschouwelijk beeld is voor de wijze waarop in vroegere tijdperken de fossielen zijn ontstaan. Maar merkwaardig is ook, dat het soms gelukt om uit het opgedroogde slib van zoo'n vindplaats weer opnieuw kieuwpootkreeften op te kweken in een aquarium, zooals enkele onderzoekers deden.

Het is en blijft echter geen alledaagsche ontmoeting, wanneer men na stortregens in voorjaar en nazomer in regenpoelen zulke eigenaardige ronde, lichtolijfbruine, iets doorzichtige pantsertjes ziet rondroeien. Vlug zijn ze in 't geheel niet en makkelijk met de hand te scheppen. Maar sierlijk is deze, onze grootste zoetwaterbladpootkreeft, zeker. In gevangenschap schijnen zij het echter niet zoo heel lang te kunnen volhouden, maar wel eenige dagen. Uit slib opgekweekte exemplaren schijnen niet hun vollen wasdom te krijgen; wellicht buiten, in tobben of bekkens, wel.

Ten slotte laat ik hieronder eenige literatuur volgen voor hen, die verder willen doordringen in het leven en den bouw van dit uiterst interessante dier, dat ons door z'n overouden vorm en stamboom, alsmede door z'n geheimzinnige levenswijze, aantrekt.

Wijster (Dr.) 13 Nov. 1922.

W. BEIJERINCK.

LITERATUUR.

- E. Korschelt u. K. Heider. Lehrbuch d. vergleich. Entwicklungsgeschichte der wirbellosen Tiere. Spezieller Teil Heft II. Jena.
 J. C. Schäffer. Der krebsförmige Kiefenfusz mit der kurzen und langen Schwanzklappe beschrieben. Regensburg.
 J. C. Schäffer. Der fischförmige Kiefenfusz in steh. Wässern v. Regensburg. Regensburg 1754.
 F. Braem. Ueber die Gattung Apus (1893) Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 56.
 C. Claus. Bau u. Entw. v. Branchipus stagnalis u. Apus cancriformis 1873. Abh. d. Königl. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen Bd. 28.
 A. Behning. Ueber die vergleich. Morph., sowie über die temporale und Lokalvariation der Phyllopodenextremitäten Leipzig 1912.
 E. Hesse. Zum Vorkommen der Männchen von Apus productus. (Zool. Anzeiger Bd XLV nr. 6. 1915).
 C. B. Klunzinger. Ueber das Vorkommen des Apus cancriformis in Württemberg. (Jahreshefte des Vereins. für vaterl. Naturkunde in Württ. 1902).
 N. v. Zograf. Phyllopodenstudien (Zeitschr. f. wiss. Zoologie Bd. 86 Heft 3 1907).
 W. Bölsche. Van Zonnen en Zonnestofjes. (Hoofdstuk over De Kreeft die uit den Hemel valt).

AVIFAUNA GOUDANA.

LIJST DER TOT DUSVERRE IN DE OMSTREKEN VAN GOUDA IN WILDEN STAAT WAARGENOMEN VOGELSOORTEN (Vervolg).

55. *Sylvia atricapilla atricapilla* (L.) — Zwartkop.

In voor- en najaar in klein aantal op den trek; een enkele maal is ook een exemplaar in den zomer waargenomen. In November 1919 (den 15den) heb ik nog een exemplaar in het Stadspark waargenomen. Vergelijk: „Avifauna Neerlandica”, pag. 39.

56. *Sylvia borin borin* (Bodd.) — Tuinfluiter.

Vrij algemeene zomervogel van April tot September. Broedvogel.

57. *Acrocephalus schoenobaenus* (L.) — Rietzanger.

Zomervogel van April tot September. Vrij algemeene broedvogel.

58. *Acrocephalus arundinaceus arundinaceus* (L.) — Karekiet.

Vrij algemeene broedvogel, waar veel riet staat.

59. *Acrocephalus scirpaceus scirpaceus* (Herm.) — Kleine Karekiet.

De meest algemeene rietzanger! Broedt in de plasjes en slootjes. Aanwezig van half April tot September. In den zomer van 1919 werd in een slootje langs het „Van Iterson-Ziekenhuis” een nest gevonden, dat slechts aan twee stengels bevestigd was; het is nog in ons bezit.

60. *Acrocephalus palustris* (Bechst.) — Boschrietzanger.

Algemeene zomervogel van Mei tot September. Vooral als broedvogel in grienden aan te treffen. Broedde vroeger te Goudarak, thans door het verdwijnen der meeste grienden niet meer.

61. *Locustella luscinioides luscinioides* (Savi) — Nachtegaalrietzanger.

Den vogel zelf hebben we nog nooit waargenomen; hij komt hier ongetwijfeld voor!

In de „Ootheca Wolleyana”¹⁾ wordt het broeden dezer soort bij Ouderkerk a./d. IJssel vermeld. In deze collectie bevinden zich de volgende door John Baker bij Ouderkerk verzamelde eieren:

5 stuks, 20 Mei 1859,

5 stuks, 28 Mei 1859.

Wolley ontving deze eieren in 1893 van A. F. Sealy.

62. *Turdus merula merula* L. — Merel.

Streeknamen: Marel, Mèrel.

Algemeen. Broedt overal in struikgewas en heggen; de langs wegen liggende nesten worden bijna zonder uitzondering uitgehaald. De Merels wier domicilies zich bij woningen bevinden zijn standvogels, de andere zomergasten. De Merels in parken en plantsoenen blijven ook den geheelen winter. In den herfst weinig of geen doortrekkers.

Swanenburg vond 23 Juni 1921 te Waddinxveen een verlaten (!) Merelnest met 3 eieren en één Zanglijsterei, evenals een Merelei, gedeeltelijk gebroken. 't Is buitengesloten, dat dit laatste ei er door menschen ingelegd zou zijn. Paul Leverkühn vermeldt ook een dergelijk geval in „Fremde Eier im Nest” (1891) p. 103. De Mereleieren waren hierbij echter uitgekomen.

Bij een contrôle der nestkastjes in het Stadspark op 22 April 1922 vonden we in een gewone Vliegenvangerkast een Merelnest, waarin de binnenlaag ontbrak! 't Wijfje zat er op, toen we erbij kwamen. Later broedde hierin — 't nest werd niet verder gebouwd — een Vliegenvanger.

De Heer Wolda spreekt over iets dergelijks in „Ornithologische Studies” I (1918) p. 46. Zijn proef mislukte toen ten deele, het bleef bij het sleepen van nestmateriaal, de Merel kreeg last van haar staart, wat hier ook wel het geval zal zijn geweest.

1) Ootheca Wolleyana: An illustrated Catalogue of the Collection of Birds' Eggs, begun by the late John Wolley and continued with additions by the editor Alfred Newton. 4 vol. London 1864—1907.

63. *Turdus torquatus torquatus* L. — Beflijster.

Een tiental jaren geleden werd een exemplaar dezer soort gevangen door een tuinder aan den Schielandschen Hoogen Zeedijk. Het clublid Swanenburg nam er 3 December 1921 één waar op den straatweg van Gouda naar Reeuwijk.

64. *Turdus philomelos philomelos* Brehm — Oostelijke Zanglijster.

Over geen bewijsmateriaal beschikkend, kunnen we de quaestie welke subspecies hier voorkomen, niet naar behooren oplossen. We nemen aan dat hier op den trek voorkomt de meer grauwe noordelijke en noord-oostelijke vorm. (Zie: Jaarbericht der Club van Ned. Vogelkundigen No. 1, p. 10.)

65. *Turdus philomelos clarkei* Hart. — Westelijke Zanglijster.

Streeknaam: Regenfluit.

Even talrijk als de Merel, komt in het stadspark zelfs meer voor. Broedt op dezelfde plaatsen. De lijsters in de plantsoenen en in de nabijheid van woningen zijn standvogels, de andere trekvogels. Voor een twintigtal jaren was de Zanglijster te Goudarak als broedvogel onbekend. In 1921 werd in de Aalscholverskolonie „Lekzicht” een witgevekte Zanglijster waargenomen; het nest werd bij 't weggappen van hout gevonden, de vogel keerde er echter niet meer op terug. Naar J. de Bruyn me mededeelt vermindert het aantal Merels en Zanglijsters in de omgeving van Oudewater.

66. *Turdus pilaris* L. — Kramsvogel.

Streeknaam: Strontvogel.

Trekt 's winters in groote troepen, waaronder zich soms Koperwieken bevinden, rond.

67. *Turdus musicus musicus* L. — Koperwiek.

Streeknaam: Grauwe Lijster.

Zeer algemeen van eind September, begin October tot 't midden van April. In de plantsoenen verblijven ze steeds op dezelfde plaatsen, een enkelen dag verdwijnen ze, maar ze komen weer spoedig terug. In den omtrek zwerven ze in groote troepen rond. Op den trek worden er vele geschoten.

68. *Luscinia megarhyncha megarhyncha* Brehm — Nachtegaal.

De Nachtegaal komt hier vermoedelijk alleen op den trek voor. Naar men mij meedeelt, een zeldzame verschijning in de Boskoopsche kwekerijen. In Mei 1919 werd een exemplaar gedurende drie dagen waargenomen bij het Jachthuis te Linschoten.

69. *Erithacus rubecula rubecula* (L.) — Roodborst.


Als wintergast algemeen: In 't begin van September komen de eerste exemplaren, welke in April weer wegtrekken. In September, October en November zingen ze geregeld, dan zwijgen ze tot in het laatst van Januari. In de tweede helft van Februari beginnen ze hier te paren.

Bij de Roodborst sta ik voor hetzelfde verschijnsel, dat ik reeds te voren bij de Vlaamsche Gaai vermeldde: de Roodborst is ons als broedvogel alleen bekend in het Linschoter Bosch. Dr. Eykman schrijft ervan:

„Algemeen het geheele jaar door, ook als broedvogel”. (IJsselstein) en de Heer Crèvecoeur: „Een algemeen voorkomend vogeltje gedurende het geheele jaar”. ('s-Gravenhage). Waarschijnlijk ook broedvogel in „de kooi” te Lekkerkerk.

Wie helpt mee aan de oplossing van dit verschijnsel? 't Kan toch niet alleen zijn oorzaak vinden in de weinige boomengroepen in deze streek!

70. **Phoenicurus phoenicurus phoenicurus (L.)** — Gekraagde Roodstaart.
Streeknaam: Koevinkje, Roodborst.
Algemeene zomervogel van Maart tot September. Broedt veel in knotwilgen.
71. **Phoenicurus ochrurus gibraltariensis (Gmel.)** — Zwarte Roodstaart.
Komt een enkele maal voor, o. a. te Gouderak waargenomen. In „Falco” 1917, p. 8, beweert Kleinschmidt dat de Spaansch-Portugeesche Zwarte Roodstaart niet identisch is met den Middeneuropeeschen. Hij steunt hierbij op door Dr. Hugo Weigold verzameld materiaal. Deze quaestie schijnt nog niet voldoende uitgemaakt te zijn.
72. **Oenanthe oenanthe oenanthe (L.)** — Tapuit.
We troffen tot nu toe dezen vogel alleen aan in de weiden van den polder Steyn, den Zuidplaspolder, bij Waddinxveen, langs de Plassen en het oosten van ons observatiegebied. Daar vogels werden waargenomen in Mei en Juni, is het niet onwaarschijnlijk, dat de Tapuit hier sporadisch broedt.
73. **Saxicola rubetra rubetra (L.)** — Paapje.
Weinig algemeene zomervogel van Maart tot September.
74. **Prunella modularis modularis (L.)** — Bastaardnachttegaal.
Vrij algemeene broedvogel; ook den geheelen winter waar te nemen.
75. **Troglodytes troglodytes troglodytes (L.)** — Winterkoning.
Streeknamen: Klein Keesje, Klein Jantje, Jan-Teunisje (Oudewater), Tuinsluiper (Gouderak), Pieter-Jan-Teunis (Boskoop).



Zeer algemeene broedvogel. Zingt den geheelen winter. Swanenburg vond in 1921 een in 1920 gebouwd Merelnest op een balk. In 1921 had een Winterkoning er zijn nest in gebouwd. Dit nest had echter geen dak, doordat er een balk schuin boven zat, die blijkbaar voldoende werd geacht. 23 April van dit jaar vonden we ook in een Vliegenvanger-

kastje een Winterkoningnest, waarbij geen dak aanwezig was. De vogel had het dak van de kast als dak gebruikt. (Zie fig.).

76. *Hirundo rustica rustica* L. — Boerenzwaluw.

Zeer algemeene zomervogel van begin April tot half October. Broedvogel in gebouwen en onder bruggetjes e.d. Eenige jaren geleden werd te Boskoop een wit exemplaar waargenomen.

77. *Chelidon urbica urbica* (L.) — Huiszwaluw.

Algemeene zomervogel van 't eind van April of 't begin van Mei tot het begin van October. Broedt uitsluitend tegen gebouwen.

Naar J. de Bruyn mij schrijft, neemt het aantal Huiszwaluwen bij Oudewater af.

78. *Riparia riparia riparia* (L.) — Oeverzwaluw.

Hier en daar in kleine kolonies broedend. In 1919 was dicht bij de stad een kolonie aan de spoorbaan Gouda—Utrecht. Ook langs de Gouwe bevond zich een kolonie.

De Heer de Bruyn - Gouderak vermeldt nog de volgende bijzonderheid: „Broedt onder de zoogenaamde hoofdeneinden („hoveland” of „ovelend” zeggen de Gouderakkers; hoofdeneinden noemt men hier de landhoofden van de kleine bruggetjes, die wegen en weilanden onderling of met elkaar verbinden). Een tiental jaren geleden werd even voorbij Gouderak een steenoven afgebroken; in den steilen dijkwand, die daardoor vrijkwam, nestelden spoedig een 150 paartjes. In het jaar daaraanvolgend werd de dijk weer in orde gebracht, zoodat de vogels niet weer zijn teruggekeerd.

De Heer Drijver deelde mij nog mede, dat hij in 1907 een kolonie zag bij Reeuwijk: „De oeverzwaluwkolonie zag ik toen ik van Boskoop naar Reeuwijk fietste, in de buurt van Reeuwijk, aan den zuidkant van den weg. Het was aan een steil afgegraven kant (ongeveer 1 M. hoog of iets meer) en er vlogen zooveel Zwaluwen in en uit, dat het leek, als of het een bijenzwerm was. Er moesten stellig honderden paren zijn geweest aan dien langen afgegraven kant.” Deze was de grootste kolonie, die de Heer Drijver ooit zag.

In den nazomer vereenigen Huis- en Boerenzwaluw en Oeverzwaluwen zich tot groote troepen. Zoo houden zich dan gedurende eenige weken honderden Boeren- en Huiszwaluwen op in de rietbosschen van de Reeuijksche Plassen. Oeverzwaluwen komen in deze troepen weinig voor.

79. *Apus apus apus* (L.) — Gierzwaluw.

Streeknamen: Scheerzwaluw, Langwiek, Schrèter.

Zeer algemeene zomervogel van 't eind van April, begin Mei tot half Augustus; een enkel exemplaar blijft tot in September. Broedt overal, niet alleen in hooge gebouwen als kerktorens, maar ook in gewone betrekkelijk lage huizen. 's Avonds scheren honderden boven de stad, vooral om de groote gebouwen. Eigenaardig is het dan op sommige oogenblikken geen enkele Gierzwaluw te zien is, terwijl het volgend oogenblik de lucht weer is vervuld van hun gekrijsch.

80. *Caprimulgus europaeus europaeus* L. — Nachtzwaluw.

Komt een enkele maal voor!

81. *Picus viridis pinetorum* (Brehm) — Middeneuropeesche Groene Specht.

Door totaal gebrek aan materiaal is het ons niet mogelijk de hier voorkomende subspecies vast te stellen. Echter afgaande op de resultaten van het onderzoek van den Heer H. C. Siebers gepubliceerd in het Jaarbericht der Club van Nederlandsche Vogelkundigen

No. 3, nemen we, onder voorbehoud, aan, dat hier voorkomt als broedvogel *Picus viridis virescens* (Brehm) en als zwerfvogel in de wintermaanden *Picus viridis pinetorum* (Brehm).

82. ***Picus viridis virescens* (Brehm)** — Engelsche Groene Specht.

Vroeger genaamd *Picus viridis pluvius* Hart.

Vrij algemeene broedvogel in het oosten van het observatie-gebied.

83. ***Dryobates major major* (L.)** — Noordelijke Groote Bonte Specht.

Ook hierbij, en bij de volgende subspecies, is het door gebrek aan materiaal niet mogelijk het voorkomen vast te stellen. In de zwerfperiode zal deze subspecies hier ongetwijfeld aanwezig zijn.

(Vergelijk het bovengenoemde artikel van den Heer Siebers).

84. ***Dryobates major pinetorum* (Brehm)** — Middeneuropeesche Groote Bonte Specht.

Vrij algemeen. Broedvogel.

85. ***Dryobates minor comminutus* (Hart.)** — Kleine Bonte Specht.

Te Hekendorp werd op 19 Juni 1922 een ♀ waargenomen. Ik ontving ook nog eenige mededeelingen over het voorkomen dezer vogel te Gouderak. De Kleine Bonte Specht zou er in den winter eenige malen zijn waargenomen. Daar het feit me van drie van elkaar onafhankelijke zijden werd bevestigd, acht ik het alleszins betrouwbaar.

86. ***Dryocopus martius martius* (L.)** — Zwarte Specht.

Het clublid de Bruyn - Oudewater schreef me hierover:

„Woensdag 4 Januari 1922 nam ik een Zwarte Specht waar, ongeveer een half uur ten noorden van Oudewater. Het dier zat rustig te hameren en vloog telkens van den eenen boom naar den anderen waar het zijn arbeid voortzette.”

In de clubvergadering van 18 Februari 1922 deelde Van der Voo mede, dat hij 11 Februari 1922 een exemplaar te Hekendorp had waargenomen. Voor 't eerst werd in den winter 1921—1922 een Zwarte Specht waargenomen in het Linschoter Bosch, waar dit exemplaar den geheelen winter verbleef, en naar de jachtopziener me verzekerde elken dag aanwezig was, zoodat dit exemplaar een ander is dan die te Hekendorp en Oudewater werden gezien. In het eerste geval geloof ik wel met hetzelfde individu te doen te hebben.

87. ***Jynx torquilla torquilla* L.** — Draaihal.

Eenige jaren geleden een exemplaar waargenomen in een particulier park te Gouda. Ook te Gouderak en Hekendorp een enkele maal waargenomen.

88. ***Cuculus canorus canorus* L.** — Koekoek.

Algemeene zomervogel van begin Mei tot begin September. De roep wordt 't laatst gehoord in de tweede week van Juli. De laatste bekende datum waarop de Koekoeks-roep gehoord werd is 19 September 1919.

Eieren van den koekoek vonden we in nesten van: Graspieper, Witte en Gele Kwikstaart, Kleine Karekiet, Tuinfluit en Heggemus.

Ook hier heerscht nog algemeen de meening dat de Koekoek 's winters in een Sperwer verandert. Wanneer de Koekoek lacht, meent men dat er regen komt!

89. ***Alcedo atthis ispida* L.** — IJsvogel.

Slechts op bepaalde vaste plaatsen aan te treffen. In de naaste omgeving namen we den

IJsvogel waar in het Van Bergen IJzendoornpark (Stadspark), in den Voorwillens, langs den Schielandschen Hoogen Zeedijk, Goejanvervelledijk en op de plassen. Hoewel de IJsvogel hier ongetwijfeld broedt, is het ons nog niet gelukt een nest te vinden. In het Stadspark, Voorwillens en langs de dijken zien we deze soort alleen na den broedtijd en in den winter.

90. **Coracias garrulus garrulus L.** — Scharrelaar.

De Heer Snouckaert van Schauburg deelt in „Avifauna Neerlandica, Aanvullingen en Verbeteringen” (Club van Nederlandsche Vogelkundigen. Jaarbericht No. 5, 1915) mede dat volgens de aantekeningen van onzen bekenden ornitholoog Mr. H. W. de Graaf in Mei 1885 een exemplaar werd waargenomen te Zevenhuizen.

91. **Athene noctua mira With.** — Steenuil.

Standvogel. Algemeen voorkomend. Broedt dikwijls in knotwilgen.

Onlangs heeft Witherby in „British Birds” (1920. Vol. XIII, pag. 283) den Steenuil uit Nederland en Vlaanderen (misschien België en een deel van Rijnland en Hannover) afgescheiden onder den naam *mira*. Het type, een ♀ ad. te Houthem 20 Nov. 1919 verzameld door den Heer P. A. Hens, den secretaris der Club van Ned. Vogelkundigen, bevindt zich thans in de collectie van Witherby te Londen.

92. **Asio otus otus (L.)** — Ransuil.

Vrij algemeen voorkomende vogel; voor zoover ons bekend alleen broedvogel in het Linschoter Bosch. In een twintigtal door ons in het Linschoter Bosch verzamelde uilenballen werden een aantal musschenschedels en muizenbeentjes gevonden.

93. **Asio flammeus flammeus (Pontopp.)** — Velduil.

Vrij zelden voorkomende vogel. Misschien ook broedvogel!

94. **Strix aluco aluco L.** — Boschuil.

Een enkele maal. In het Ornithologisch Verslag van den Heer Snouckaert van Schauburg in jaargang 6 van „De Levende Natuur” vind ik het volgende: „Den 15den Mei (1900) ontving ik uit Lekkerkerk een boschuil, alsmede twee eenigszins bebroede eieren van deze soort. Genoemd exemplaar, een ♀, was op het nest gevangen. Bij nader onderzoek bleek mij, dat het zijn nest had gehad in een knotwilg, waarvan een rij langs een weiland stonden. Dit schijnt wel het eerste goed geconstateerde geval van broeden in den Krimpenerwaard te zijn, 't geen daarom interessant is, wijl de streek aldaar zeer vlak is en er geene eenigszins uitgestrekte boomaanplantingen gevonden worden. Er waren slechts twee eieren in het nest aanwezig. Bij opening bleek het ♀ geen ver ontwikkeld ei meer aan het ovarium te bezitten.” (E. D. van Oort).

95. **Tyto alba guttata (Brehm)** — Kerkuil.

Streeknaam: Katuil. Alle uilen dragen hier den naam Katuil, hoewel meer speciaal de Kerkuil hiermede wordt aangeduid.

Standvogel. Algemeen broedend in gebouwen en boomholten, zelfs in holle boomen midden in de stad. De Kerkuil wordt hier met de grootste hardnekkigheid vervolgd, daar hij een „zeer schadelijke vogel” is!

96. **Circus aeruginosus aeruginosus (L.)** — Bruine Kuikendief.

Meermalen waargenomen, ook op de Reeuwijksche en Sluipwijksche plassen. Van broeden is ons niets bekend.

97. **Accipiter nisus nisus (L.)** — Sperwer.

Vrij algemeene wintergast. Was er in 1921 reeds in het eind van Augustus. Waarschijnlijk wel het geheele jaar waar te nemen.

98. **Buteo buteo buteo (L.)** — Buizerd.

Komt zoo nu en dan eens voor. De heer de Bruyn schrijft: „Jaagt wel eens boven de boezems” (Gouderak). Het clublid Banga vond 3 April van dit jaar in den Zuidplaspolder een exemplaar met den hals in de vork van een boom.

99. **Circaëtus gallicus (Gmel.)** — Slangenarend.

In het najaar van 1848 werd een stuk geschoten onder Nieuwerkerk a./d. IJssel. Dit exemplaar is bewaard gebleven in de verzameling van den Heer J. C. Criellaert te Rotterdam. Deze verzameling bevindt zich thans in de Rotterdamsche Diergaarde (Tijdschr. Ned. Dierk. Vereen. Deel IV, blz. LXXI).

100. **Falco peregrinus peregrinus Tunst.** — Slechtvalk.

Vrij zeldzame wintergast. Doet wel eens een aanval op de tamme duiven. In de collectie van „Artis” bevindt zich een ♂ juv. 21 October 1874, te Nieuwerkerk a./d. IJssel geschoten.

101. **Falco subbuteo subbuteo L.** — Boomvalk.

Niet zeldzaam. In de collectie vogels van de Rijks Hoogere Burgerschool te Gouda bevindt zich een exemplaar, dat op 10 September 1906 in een uiterwaard te Hekendorp is geschoten.

A. SCHEYGROND.

NIEUWE OF ZELDZAME NEDERLANDSCHE ZWAMMEN.

Claudopus parasiticus Quel. — Dit zeer merkwaardige zwammetje werd door den jongeheer H. J. Mac Gillavry bij Nunspeet gevonden. Het is een parasiet op onze gewone *Cantharellus cibarius*; waar het op de steel of lamellen kan worden aangetroffen. In habitus is veel overeenkomst met andere *Claudopus*-soorten. De hoed is doorschijnend, de kleur wit. Het geheele zwammetje is vaak nog geen halve c.M. groot.

Nolanea proletaria Fr. (syn. *N. cetrata* Schroet.). — Deze zwam is wel meestal met andere *Nolanea*-soorten verwisseld. Ze is algemeen in dennenbosschen, waar ze tusschen de *Hypnumkussens* groeit. De kleur is grijsbruin, zoowel de klokvormige hoed, als de lange brosse steel. De geheele zwam is doortrokken van vocht, en bij uitdroging sterk verkleurend. Een van de beste kenmerken is, dat de basidiën slechts twee sporen dragen. In de exemplaren, die ik onderzocht, waren haast evenveel basidiën met één enkele spore, als zulke met twee. De sporenvorm is zeer hoekig en onregelmatig. Ik verzamelde deze soort veel in den omtrek van Doorn.

Corynetes arenarius (Rostr.) Durand. — Deze aardtong-soort werd in een vroegeren jaargang van De Levende Natuur al eens vermeld en afgebeeld. Ik ontving er rijkelijk materiaal van, uit de buurt van Schoorl. Ook van het eiland Sylt kreeg ik exemplaren.

Het lijkt mij niet uitgesloten, dat deze soort op onze Noordzee eilanden en wellicht door de geheele duinstreek meer voorkomt, dan we wel vermoeden.