

Geldig is die geslachts- en soortnaam, die voor de eerste maal met een kenschetsing (beschrijving of afbeelding) werd gepubliceerd. (Prioriteitsprincipe).

Uitgaande van dit principe kan ik me in geen geval vereenigen met den naam *Muscicapa grisola grisola* (L.) 1766. Ook Linné's naam *ficedula* kunnen we niet aannemen, want de door L. gegeven beschrijving is onvoldoende. Dr. Ernst Hartert (*Vögel der Paläarktischen Fauna*) noemt Linné's naam: *Motacilla Ficedula*, Syst. Nat. Ed. X (1758) p. 185 ex. „*Fauna Suecica*” p. 231 (1746), doch de beschrijving is volgens hem onduidelijk. In de „*Fauna Suecica*” wordt zelfs gesproken van: „*Color supra totus e fusco castaneus*” (kleur der bovenzijde geheel roodbruin!) Van de vlekjes op het voorhoofd wordt niets vermeld.

Hartert neemt Linné's beschrijving niet aan als zeker toepasselijk op den Grauwen Vliegenvanger en volgt daarom, strict volgens de regelen der prioriteit, Pallas' naam in Vroeg's *Catalogus Verzameling Vogelen, Dieren, Adumbratiuncula* p. 3 (1764). Pallas noemt de species aldaar *Motacilla striata*. Ik kan me hiermede uitstekend vereenigen, en zie niet in, dat ik me hierin aan een inconsequentie schuldig maak.

Bovendien kan ik mededeelen dat ook Hellmayr en Laubmann 't er mee eens zijn dat Pallas' naam *striata* dient te worden aangenomen, daar *ficedula* te onzeker is en *striata*

naam *striata* heeft, want volgens 't regelen der prioriteit, Pallas' naam in Vroeg's *Catalogus Verzameling Vogelen, Dieren, Adumbratiuncula* p. 3 (1764). Pallas noemt de species aldaar *Motacilla striata*. Ik kan me hiermede uitstekend vereenigen, en zie niet in, dat ik me hierin aan een inconsequentie schuldig maak.

Bovendien kan ik mededeelen dat ook Hellmayr en Laubmann 't er mee eens zijn dat Pallas' naam *striata* dient te worden aangenomen, daar *ficedula* te onzeker is en *striata*

naam *striata* heeft, want volgens 't regelen der prioriteit, Pallas' naam in Vroeg's *Catalogus Verzameling Vogelen, Dieren, Adumbratiuncula* p. 3 (1764). Pallas noemt de species aldaar *Motacilla striata*. Ik kan me hiermede uitstekend vereenigen, en zie niet in, dat ik me hierin aan een inconsequentie schuldig maak.

KERST ZWART.

Uit Groningen. — In den Noordpolder was Maandag 26 Februari een prachtige trek waar te nemen van kievten, die in aantal variërende troepen of in paren uit min of meer W. N. W. richting aankwamen en ongeveer recht in den wind, meerendeels laag over naar het lokkende Zuid-Oosten trokken. Zelden zag ik echter zoo'n leeuweriken-beweging als op dien dag langs de kust en binnen den polder plaats vond. Zonder overdrijving zijn dien dag meer dan 7000 leeuwerikken meermalen in troepen van $\pm$ 500 gepasseerd.

Voor de vorst, die omstreeks den 10en Februari inviel, was er op Rottumeroog ook reeds vrij drukke trek van leeuwerikken. Van graspiepers heb ik daar tot mijn verwondering voor en tijdens de vorstperiode niets bemerkt. Wel kwam er een enkele kievit. Deze laatste vogels trokken in snelle vlucht westwaarts. Het zou voor de Groningers en ook voor anderen interessant zijn om eens te weten waar alle herfst-kieviten — in September en October zijn er duizenden langs de Waddenkusten aan te treffen, over geheel N. Groningen (en N. Friesland?) verspreid — in den winter vertoeven.

De heer Drijver heeft een kievten-concentratie op Texel opgemerkt. Zouden de „Groninger” vogels de kortste dagen in het dragelijker klimaat van W. Nederland doorbrengen? In 't laatst van Februari zijn de kieviten weer prachtig komen opzetten. 28 Februari op weg naar Zutphen zag ik van uit den trein in midden-Drente en benoorden Zwolle in de Steltloopers-vlakte, 'n soort Vogelweide, er al zeer veel, w. o. ook wel broedvogels zullen zijn.

Wij hooren spoedig weer van 't eerste ei.

Na de vorst zijn de Goudpluvieren ook weer in den Noordpolder verschenen. Heerlijk klonk hun zacht-weemoedig en toch weer zoo op verren afstand duidelijk hoorbaar