

**Koekoek.** — Naar aanleiding van een vraag van den heer A. J. de Lorm kan ik U mededeelen dat ook ik dit jaar een koekoeksei in het nest van een nachtegaal heb gevonden.

Om het nest van de nachtegaal te sparen hebben wij het ei van de koekoek eruit genomen en gelegd in het nest van een grauwe vliegenvanger; tegelijk één ei van deze verwijderd.

Dit gebeurde 16 Juni des namiddags en ziet, den 17den was de jonge koekoek geboren en had spoedig de andere eieren van de vliegenvanger uit het nest gewerkt. Deze bleken nauwelijks bebroed te zijn. Het moet dus een vreemde gewaarwording voor de pleegouders zijn geweest, om na enkele dagen broeden reeds een gulzig jong te moeten verzorgen. De koekoek is heden drie weken oud, heeft het nest dat hem te klein werd verlaten en zit er nu vlak naast achter eenige beschermende bladeren.

Binnen enkele dagen zal hij wel in staat zijn weg te vliegen.

De jonge nachtegaleen drie in getal, zijn uitgevlogen.

Zwolle, 8 Juli 1923.

C. H. THIEBOUT.

**Tapuit-Koekoek.** — In verband met Uw verzoek in „het Vogeljaar” kan ik U mededeelen, dat een mijner kennissen verleden jaar (Mei—1922) een jongen koekoek aantrof bij den in-

Achter Wassenaarsche Slag. Mei 1922.

Foto C. VREDENDAAL.



Jonge Koekoek bij den ingang van een konijnenhol, waarbinnen hij door een tapuitenpaar is uitgebroed.

gang van een konijnenhol in de duinen voorbij (van den Haag uit) den Wassenaarschen Slag — waarbinnen het dier door een *tapuiten*paar was uitgebroed.

Hierbij doe ik U een foto van het desbetreffende feit toekomen.

**De Kluit in Friesland.** — Op verschillende plaatsen lees ik, dat de Kluit voorkomt op weinig plaatsen en dat hij in geheel west Europa zeldzaam is.

Hier bij Lemmer trof ik verleden jaar een paar, 't welk gebroed heeft. Anders merkte ik ze niet op.