

hollen boom elk jaar een roodstaart zijn nest bouwde, en hierin ook een koekoek er zijne in deponeerde, dit had precies de kleur der roodstaart eieren, maar was alleen grooter. Verleden jaar nu broedde een roodborstje in het hol en nu lag er 't zelfde koekoek's roodstaart-ei in wat het jaar daarvoor in 't roodstaartennest lag.

Arnhem.

J. ASJEE.

**Veronica austriaca.** — Den 7en Juni had ik het geluk aan den weg naar het Kraaijenbosch nabij Sleenwijk een plekje te vinden, dat geheel blauw was van de *Veronica austriaca* (Oostenrijksche Eereprijs).

Gorinchem 13 Juni 1924.

W. HEISTERBORG.

**Overjarige poppen *Phalera bucephala*.** — 27 Aug. 1922 Amsterdam. Op *Salix alba* gevonden kolonie van  $\pm$  25 rupsen. 30 Aug. Aanstalten tot verpoppen. De meeste reeds onder de aarde. 3 Sept. Alle poppen zijn verhard. Enkele mislukt. 11 Juni 1923. De vlinders ontpoppen zich. 15 Juni 1923. Enkele poppen zijn nog niet uitgekomen, voelen koud aan, dus leven waarschijnlijk. Half Juni 1924: Drie poppen van 1922 nog uitgekomen; volmaakte vlinders; 1 ♂ en 2 ♀♀; zeer mager. (Na 22 maanden vasten! *Red.*).

Amsterdam.

M. B. VAN GINKEL.

Wij hebben juist ook dit jaar een aantal vlinders uitgekregen uit poppen die twee winters hebben overgelegen n.l. Linden-, Populieren- en Pauwoogpijlstaart. Het is bekend, dat het zoo nu en dan gebeurt. Of het verschijnsel ditmaal meer voorgekomen is dan andere jaren en wat de oorzaak kan zijn, weet ik niet.

J. HS.

**De dennenorchis.** — Twee leerlingen van de Rijkskweekschool alhier brachten mij dezer dagen een paar exemplaren van de dennenorchis (*Goodyera repens*), gevonden in een dennenbosch bij Voorst. Een onderzoek ter plaatse leerde, dat er naar schatting tusschen de drie- en vierhonderd planten stonden. De naastbijzijnde bekende vindplaatsen zijn de bosschen van de Kranekamp bij Diepenveen, waar Dr. Vuyck de plant in 1915 ontdekte, en de bosschen van het Kon. Domein Het Loo, waar zij een paar jaar geleden door den Chef-bloemist, den Hr. Berendsen, aangetroffen werd.

Deventer.

H. R. HOOGENRAAD.

**Bembex rostrata.** — Deze groote vliengendoeder, die wij de harkwesp hebben genoemd, is sedert een jaar of tien hier al zeldzamer en zeldzamer geworden en lijkt nu geheel verdwenen. Destijds had ik verschillende plaatsen hier in de duinen waar het wemelde van deze groote woeste zwart-met-groengele wespen en heele hellingen zagen bont van het witte zand, dat zij voor hun holen hadden uitgeworpen. Hoe is dat elders in ons land? Ik heb er vroeger ook enorm veel gezien in de omgeving van Apeldoorn en op Texel.

Het kan niet liggen aan voedselnood, want vliegen zijn er meer dan ooit. Bij voorkeur bemachtigen zij zweefvliegen en ook daaraan is geen gebrek. Het eenige, waar ik in deze richting aan denken kan, is dat bij den algemeenen achteruitgang van den plantengroei in de droge streken deze wespen minder gelegenheid vonden om hun vliegen te vangen op de schermen van peen, bevernel, bereklauw e.d.

Ook is het mogelijk dat de sluipvlieg *Miltogramma* er op moet worden aangezien. Die legt zijn eitjes in de hollen van onze *Bembex* en de wettige bewoner delft dan het onderspit. En nu kwamen die *Miltogrammen* hier zoo talrijk voor, dat er geregeld voor ieder *Bembex*-nest wel een stuk of drie op de loer zaten.

Wie heeft nu dezen zomer Harkwespen waargenomen?

JAC. P. TH.

#### GEVRAAGD:

Voor de Stedelijke Volksboekerij van Antwerpen de jaargangen 21 en 22 van De Levende Natuur.

Aanbiedingen aan het Gemeentebestuur van Antwerpen afdeling Volksboekerijen, Blindenstraat 19, Antwerpen.