

te gaan, dan zat hij hen net zolang achterna, tot ze ten einde raad hun hok binnen wipten, waarna hij onmiddellijk volgde.

Utrecht, Gem. H.B.S. 5 j. c.

S. H. VISSER.

Roofvogels. — 'k Moest op dezen eersten zonnigen Septemberdag even een paar boodschappen in Eibergen gaan doen. En zie, daar cirkelden boven 't rustige dorpje twaalf roofvogels rond, statig en vrij hoog. Langzaam zakten ze naar 't oosten af. Jammer genoeg, had ik m'n kijker niet meegenomen, maar èn door de grootte, èn door den vorm èn doordat ik van enkelen de lichte onderzijde met zwarte vlekken of strepen kon waarnemen, heb ik ze voor buizerds gehouden. Nog nooit had ik zooveel roofvogels bijeen gezien en genoot van het schouwspel.

Rekken, 6-9 '24.

G. C. TIECKEN, H. d. S.

De duur van den trek. — Hoewel ik geen expert ben op het gebied van kennis van de kleinere vogelsoorten, heb ik hier op de Veluwe aan de Zuiderzee reeds jaren lang gelet op het trekken, ook op het aankomen der vogels. Van Spreeuwen heb ik genoteerd trekdagen Noordwaarts vanaf 1 Januari tot in Maart: van Leeuwerikken vanaf 14 Januari tot half Februari; van Kraaien vanaf 12 Januari tot in Maart, Bonte Kraaien nog later. Tusschen den eersten en den laatsten trekdag (deze uitdrukking slaat natuurlijk alleen op mijne gebrekkige notities) ligt dus bij mij een betrekkelijk lang tijdverloop. Ik heb altijd gemeend dat de gesteldheid van het weder, het eenige trekmotief is, maar ik geef natuurlijk mijne meening gaarne voor beter.

Een en ander ter beantwoording van uw vraag „letten H.H. trekwaarnemers wel eens op de laatst aankomende?”

Ermelo, 14 Sept. '24.

G. H. VAN WAVEREN.

Nog eens: de Harkwesp. — Omtrent de verspreiding van *Bembex rostrata* in ons land, kan ik het volgende vertellen:

Voor 't eerst maakte ik kennis met dezen prachtigen roover, gedurende de tweede helft van Juli 1921, in het Lutterzand bij *Denekamp*. De dieren broedden daar in een kolonie van c.a. 15 à 20 nesten, misschien op een andere plek nog wel meer; niettegenstaande hun wilde bewegelijkheid lieten ze mij, vlak voor de aardige platte koepeltjes, rustig toekijken naar hunne ijverige graafbewegingen. Miltogrammen heb ik toen niet gezien, doch wèl een zeer groote bruin-zwarte vlieg, getooid met helder oranje-gele dwarsbanden, welke de *Bembex*'en achtervolgde. De grootste moeite deed ik zoo'n beest te pakken te krijgen, doch 't is me helaas niet gelukt. Zij vloog op de manier van een *Asilus*, maar kwam niet in een andere houding als de gevolgde vliegrichting op den grond terecht. — Een paar weken daarna zag ik de harkwespen in slechts weinige exemplaren terug in *Noord Brabant*, midden in de z.g. „Drunensche duinen”; een woest en onherbergzaam zandig terrein.

In het voorjaar van 1922 vond ik *Bembex* weer, nu in groot aantal, op bloeiende wilgeroosjes (*Ep. angustifolium*), dicht aan de grens bij *Beljeld* (Limburg); dit waren nog uitsluitend honingzoekende ♂♂. In hetzelfde jaar zag ik, in gezelschap van F. Koster, weer een kleine kolonie (hoogstens 7 à 10 nesten) in het zandige gebied ten Z. van *Ommen*.

Sindsdien bezocht ik deze plaatsen niet meer, doch in den voorzomer van dit jaar zag ik de harkwespen ook in de omgeving van *Winterswijk* hun nestholen graven en wel in den leem-achtigen grond bij de steenbakkerij „de Vlijt”. Tenslotte ving ik nog een ♀ in Limburg bij *Reuver*, op 30 Juni.

Zonder twijfel is *Bembex*, althans in het Oosten en Zuiden des lands dus nog lang niet verdwenen!

Amsterdam, 9 Sept. '24.

M. A. LIEFTINCK.

Drosera obovata. — De in ons land tot nu toe zeer zeldzame en genetisch belangrijke bastaard: *Dr. anglica* × *Dr. rotundifolia* (*Dr. obovata*), vond ik onlangs, hoewel nog zeer schaarsch, op de terreinen van de boschwachterij Dwingelo (Staatsboschbedrijf). Door den heer H. B. Hoogenraad uit Deventer was ik aangespoord er naar te gaan zoeken, omdat de