

flink wandelen en in school een aquarium en een terrarium onderhouden, dan zullen ze dit boekje met dubbel plezier lezen.

Ik vind het schrijven van dergelijke boekjes buitengewoon moeilijk en heb er mij nooit aan durven wagen. Daarom doet het mij bijzonder veel genoegen, dat ik dit „Wonderland” kan prijzen.
T.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Sepia-vondsten. — Toen ik mij Dinsdag 26 Augustus vanaf het Wassenaarsche Slag langs het strand naar huis wilde begeven vond ik tusschen het aangespoelde schelpengruis een kleine lichtroze gekleurde Sepiaschaal. Ik meende, dat ze van een kleine *Sepia orbignyana* afkomstig was, doch bij nauwkeuriger bekijken bleek de schaal inplaats van een punt (rostrum) eene, in de lengterichting geplaatste, kam te bezitten. Waarschijnlijk had ik dus met de schaal van een *Sepia elegans* te doen, die ik tot dusver hier aan het strand nog niet had aangetroffen. Hopende op meer van dergelijke zeldzaamheden ben ik den vloedlijn tot de Batterijen (5 ½ K.M.) gevolgd en was zoo gelukkig 12 exemplaren van *Sepia elegans* en een tiental flinke brokstukken van *Sepia orbignyana* bij elkaar te verzamelen. Verder naar Scheveningen kon ik de vloedlijn tusschen de talrijke paardesporen niet meer volgen, zoodat ik het zoeken moest opgeven. Aangemoedigd door dit succes ging ik er den volgende morgen weer te fiets op uit. Tot aan het Wassenaarsche Slag vond ik nu slechts enkele stukjes van *S. orbignyana*. Ik besloot nog maar eens een K.M. verder door te loopen, daar ik toch met de fiets naar huis terug kon. Over dien betrekkelijk korten afstand vond ik toen nog 't exemplaar van *S. elegans*. Den daaropvolgenden Zaterdag was er niets meer aan het strand te vinden. Hoogstwaarschijnlijk zullen er, na het stormachtige weer van de laatste weken, (er was ook een zwart stormvogeltje aangespoeld) ook wel op andere plaatsen van onze kust schalen van bovengenoemde Sepiasoorten opgemerkt zijn. De gevonden *S. elegans*schalen waren geen van allen gaaf. De smalle chitinerand was bij de meeste exemplaren verdwenen. De lengte van de schalen varieerde van 4—6,5 c.M., het meerendeel was echter \pm 5,5 c.M. Behalve door het ontbreken van een punt en door de mindere grootte verschilden de schalen van *S. elegans* van die van *S. orbignyana* door een ribvormige longitudinale verhooging midden op den bovenkant van de schaal. Bovendien was het rozegekleurde gedeelte van de schaal bij *S. elegans* door een lichtbruine omlijning duidelijk van de geelwitte kanten afgescheiden, wat bij *S. orbignyana* niet het geval was. Bij laatstgenoemde soort gingen het roze en het geel ongemerkt in elkaar over.

Scheveningen.

J. A. VAN LEEUWEN JR.

Strandvondsten op Texel. — Op 22 en 23 Juli waren, waarschijnlijk ook onder invloed van den krachtigen Westenwind, op het Texelsche strand bezuiden Koog verscheidene exemplaren van *Sepia orbignyana* Fér. aangespoeld, waaronder acht geheel gave. Verder vond ik op een stuk kurk eenige honderden Noordsche rotsboorders (*Saxicava arctica* L.) en eenige paardenzadels (*Anomia ephippium* L.) Zeer vele exemplaren waren aangespoeld van de fossiele *Tapes Senescens*, die ten Noorden van Callantsoog nog al eens voorkomt.

Ook vond ik vele exemplaren van de Gedoornde Hartschelp (*Cardium echinatum* L.), die hier bij Scheveningen ook vrij veel voorkomt. Maar wat me opviel op Texel, was, dat van de honderden exemplaren, die ik vond, niet één voorzien was van de z.g. doorns. Alle exemplaren zagen er oud en verweerd uit, terwijl hier op Scheveningen vaak exemplaren aanspoelen, waar nog stukken van den sluitspier zelfs aanzitten, die dus zeer nieuw zijn. Komt de soort voor Texel dan niet levend voor?

Den Haag.

N. TINBERGEN.

Zwartgrauwe Vliegenvangers. — Zaterdag en Zondag, 6 en 7 Sept. j.l. heb ik hier in Den Haag en Scheveningen zeer veel zwartgrauwe vliegenvangers waargenomen. Er waren