

Nög eens de Berggamander, *Teucrium montanum* L. — Door den Heer *Haverschmidt* te Utrecht is de *berggamander* bij *Bemelen* reeds in *Aug.* '22 gevonden! Hij had deze tot nu toe ongedetermineerd in een herbarium liggen. Op het artikel in *D. L. N.* heeft hij gereageerd door onmiddellijk het ex. op te zoeken en te vergelijken. We hebben het in 2 stukken gebroken, een ex. voor her *Herb. der Nederl. Botan. Vereen.*, het 2e stukje heb ik present gekregen, tot mijn groot genoegen.
C. G. G. J. VAN STEENIS.

Strandvondsten op Terschelling. — Gedurende ons verblijf op Terschelling van 11—16 April j.l. troffen we een aantal aardige mollusken aan waarvan hieronder een lijstje volgt: ($\frac{1}{2}$ ex. wil zeggen: losse schaal; fr. wil zeggen: fragment)

A. Op het Noordzeestrand:

Volsella modiolus L. $\frac{1}{2}$ ex.; *Montacuta bidentata* Mont. vele ex.; *Tellimya ferruginosa* Mont. vele $\frac{1}{2}$ ex.; *Scrobicularia plana* D.C. slechts enkele ex.; *Lutraria elliptica* Lam. veel fr. + $\frac{2}{2}$ ex.; *Chamelea gallina* L. $\frac{3}{2}$ ex. slechts!; *Tapes pullastra* Mont. $\frac{1}{2}$ ex.; *Cardium echinatum* L. ± even algemeen als *Cardium edule* L.; *Ensis ensis* L. weinig; *Eusis siliqua* L. vele ex.; *Solen vagina* L. $\frac{12}{2}$ ex. en veel fr.; *Cultellus pellucidus* Penn. 3 fr.; *Saxicavella plicata* Mont. $\frac{3}{2}$ ex.; *Zippora membranacea* Ad. 2 ex.; *Scala clathrus* L. slechts 2 ex. *Turritella communis* L. 8 ex. en 9 fr.; *Tritonofusus gracilis* D.C. 1 fr.; *Actaeon tornatilis* L. 3 ex.; *Sepia elegans* d'Orb. 1 fr.; *Sepia orbignyana* Fér. 1 ex.

Fossiel troffen we nog aan:

Pecten varius Lam 1 fr.; *Tapes senescens* Doed 1 fr.; *Bitthium spec.* 2 fr.

B. Zuiderzeestrand en dijk:

Scrobicularia plana D.C. weinige $\frac{1}{2}$ ex.; *Littorina obtusata* L. subsp. *littoralis* L. var. *obtusata* Lam. veel aan de dijk, op de Grieë slechts 1 ex.; *Littorina littorea* overstelpend algemeen; *Zippora membranacea* Ad. 1 ex. de Grieë (aangespoeld); *Retusa obtusa* Mont. 4 ex. op de Grieë (aangespoeld).

Amsterdam.

C. v. REGTEREN ALTENA.
H. MAC. GILLAVRY.

Kokerlarven die een fuikje spinnen. — Nauwelijks een paar dagen is de April-aflevering van „De Levende Natuur” in mijn bezit, of ik kan de vraag, wie van de lezers de bovengenoemde wonderlijke kokerjuffers elders gaat ontdekken, al beantwoorden.

Wat me trouwens niet verwondert. Toen we in Augustus op de Brunsummerheide de fuikjes vonden, meende ik ze al eer gezien te hebben in Brabant. Maar ik diende me te schamen, dat ik ze toen niet nader bekeken had en zweeg. Maar nu, 11 April op excursie naar het Liesbosch, wilde ik tegelijk even zien of de terreinen langs de Bijloop onder Rijsbergen, waar we in 1916 met de Nederl. Botanische Vereeniging geweest waren, nog bestonden. En ze waren er nog! Daar over het brugje van de Bijloop hangend, dat ge op de stafkaart kunt vinden precies ten Z. van Leur, zag ik een keurig rijtje van de genoemde vangnetjes. Heel de duiker zat vol met die fuikjes, soms aan het hout van den vloer, soms aan grashalmen bevestigd, maar bijna steeds op rijen. Een flink aantal: klein en groot ± 100 per M².

De andere Bijloop-brug, die ten Z. van Etten, leverde er geen, maar wel zagen we even ten Z.W. van deze, in het genormaliseerde bed van de Bijloop, weer talrijke van die natuurlijke planktonnetten, vastgemaakt aan de stengels van *Nitella flexilis*, dat daar zeer veel groeit, niet aan *Potamogeton polygonifolius* daartusschen.

In de IJzermolensche vaart, die evenwijdig aan de Bijloop gaat, zag ik er niet.

Intusschen heb ik nu een paar kokerlarven al een dag of wat kunnen bekijken. Stroomend water heb ik hun niet kunnen aanbieden. Die luxe heeft het natuurhistorie-lokaal van de Rijks H.B.S. niet! Maar ook in stilstaand water maken ze hun spinselkokers. En daarin vielen mij sterk op de beweging van hun lichaam: duidelijk golfvormige, sinusoïdale bewegingen.

Wie leert ons wat meer kennen van de levensgewoonten van dit dier en wie vindt nu een derde standplaats?

Bergen-op-Zoom.

JAN G. SLOFF.