

Rectificatie. — In het opstel over het Meijndel-onderzoek bringe men de volgende verbeteringen aan. De sprank vermeld op pag. 69 dateert uit de jaren 1872-1874. In plaats van *onafhankelijkheid* moet op pag. 78 regel 4 van boven gelezen worden *afhankelijkheid*.
A. SCHIERBEEK.

Zomerreis van kraaien. — Zaterdag en Zondag 6 en 7 Juli tegen zonsondergang trokken honderden van kraaien (roeken?) gestadig van West naar Oost langs den Rijn in groepen van 20 à 25 vogels, telkens afgewisseld met enkele achterblijvers of voorloopers. Gisteren 8 Juni zag ik ze weer, maar in geringer aantal en vóór Zaterdag had het verschijnsel mijn aandacht niet getrokken. Wat is dit voor een beweging?

M. FARRANT-VAN DUYL.

Amphidasis betularia L. Doubledayaria Mill. in het Noorden. — Op 26 Juni tegen de avond vonden de heer N. Zandstra en ik op een trottoir hier een zwarte meterorenkop liggen. Behalve een wit vlekje, niet grooter dan een halve speldeknop op iedere schouderkop onmiddellijk tegen de kop, één wat grootere op het voorhoofd en twee zoo gekleurde achterlijfsringen is de vlinder volkomen effen zwart. Ter Haar zegt in „Onze Vlinders” over de zwarte vorm o.a.: „In het Noorden van ons land is zij tot dusver nog niet waargenomen”.

In de buurt, waar we het dier vonden, zijn slechts een paar berken, echter veel exemplaren van *Ulmus monumentalis*. We hebben het ex. afgestaan voor de vlinderverzameling van het gymnasium en de H. B. S. hier.

Winschoten, 27 Juni 1925.

W. W. SCHIPPER.

Utricularia Neglecta Lehmann. — Wie kan ondergeteekenden helpen aan *Utricularia neglecta*? De plant groeit op soortgelijke plaatsen als *Utricularia vulgaris* L., het gewone Blaasjeskruid, maar is zeer zeldzaam in Nederland gevonden. *Prodromus Florae Batavae* 1850 vol. I, blz. 207 meldt: Veenen te Oud-Leusden, Wenck in Herb. De *Flora Batava* zelf, deel XXII No. 1701 bewerkt door Dr. L. Vuyck geeft op: Afgebeelde plant Aug. Aug. 1899 door Dr. Goethart omtrek Weert gevonden. Meer mededeelingen hebben we niet kunnen vinden.

Het verschil tusschen *U. neglecta* en *vulgaris* is niet groot. Daarom is het misschien niet onnoodig dat uitéén te zetten. In niet bloeiende toestand is geen onderscheid te zien; voor de bloemen worden de volgende kenmerken opgegeven (H. Heukels: *Flora van Nederland* Dl. III blz. 256).

U. vulgaris: Bovenlip der bloemkroon ongeveer evenlang als het 2-lobbig verhemelte. Onderlip met teruggeslagen randen, afgeknot.

U. neglecta: Bovenlip der bloemkroon minstens dubbel zoo lang als het afgeronde verhemelte. Onderlip bijna of geheel vlak.

Het komt dus aan op den vorm van de onderlip (gebogen of vlak) en lengte van bovenlip ten opzichte van het verhemelte.

Verzendkosten komen natuurlijk voor onze rekening. Het beste is, de planten te verpakken in vochtig veenmos.

Groningen, Hortus Botanicus,
Nieuwe Kijk-in-'t Jatstraat 82.

E. W. CLASON.
E. LAARMAN, Hortulanus.

Libellentrek. — In aansluiting met de berichten over de libellentrek kan ik u nog berichten, dat ik op 20 Mei tegen half zeven namiddags een groote troep libellen heb waargenomen te Markelo. Ze trokken langzaam naar het Oosten.

J. PAPOUSEK, Voorzitter N. J. N., Zutphen.

Libellentrek. — De libellen vlogen hier in Enkhuizen in de richting Noord-Zuid; voor zoover ik me kan herinneren op Woensdag en Donderdag en vrijwel voortdurend. Ik zag ze o.a. aan de zeekant, waar het de indruk maakte alsof ze over het water kwamen aanvliegen en de zeemuur als rustplaats gebruikten; maar bij nader onderzoek scheen het me waarschijnlijker, dat ze in hun vlucht naar het water afdreven en dan weer gauw het land trachtten te bereiken.

Enkhuizen.

G. A. BOLKESTEIN.