

Nunspeet gevonden, dan zal hij Dr. M. G. en mij een dienst bewijzen, door mij dit op te geven met nadere vermelding der vindplaats. Ook kan hij, als hij bij zijne excursies, op het voorkomen van *Azolla* gelet heeft, dienst bewijzen met de opgave, dat hij deze plant nergens in de buurt van Nunspeet vond.

Haarlem, Kl. Houtweg 35, Haarlem.

H. HEUKELS.

Nog eens: Over *Helicella* en nog wat. — Den 26sten Septemper vond ik tusschen exemplaren van *Helicella virgata* Da Costa een aardig monstrum van de varieteit *albo-variegata* Caziot.

In plaats van elkaar gedeeltelijk te omsluiten stonden de windingen op elkaar, zonder daarom nog vrij te zijn. Alle windingen, 5 in getal, waren min of meer gekield. De hoogte van het huisje bedroeg 11 mM., de grootste breedte $9\frac{1}{2}$ mM. (zie figuur).

Over het voorkomen van de varieteit *albo-variegata* Caz. nog dit: Onder 317 *Helicella*'s, die door mij werden bekeken, bevonden zich 121 exemplaren van de varieteit, dus $\pm 38\%$.

In afwijking met wat Dr. C. A. v. d. Willigen schreef in aflevering 4 van 1 Augustus 1924 der *Levende Natuur* over de kleinere afmetingen van bovengenoemde varieteit, meen ik te mogen constateeren, dat deze in geen geval kleiner is dan de stamvorm, immers van de 317 voor de hand opge-raapte exemplaren werd de maat van 8–11 mM. lengte en 12–14 mM. breedte 48 maal bereikt door *Helicella virgata* Da C. en 49 maal door de varieteit, die wat aantal betrof ver in de minderheid was.

Overschreden werd de maximum-maat 3 maal door *Helvirgata* D.C. en 3 maal door de varieteit.

En nu nog iets over *Vertigo angustior* Jeffr.

Dat dit kleine slakje in onze duinstreek niet zeldzaam is, blijkt wel daaruit, dat in het afgelopen jaar door mij werden gevonden: 12 stuks te Katwijk onder duinwilg (bodem tamelijk vochtig), 9 stuks achter Rijksdorp, Wassenaar, onder berkeblad (bodem eveneens vochtig), terwijl ik in Meyendel, bij Scheveningen, in een vochtig berkeboschje, binnen 5 minuten 63 exemplaren telde, soms bij 5 en 6 tegelijk op bemost, rottend hout.

Voor zoover ik weet zijn ze buiten de duinstreek nog niet gevonden. Mogelijk komt het slakje slechts voor in de Noordzee-provincies. In de „Census of the Distributions of British Land- and Freshwater Mollusca staan ze vermeld voor de graafschappen langs de kust: Suffolk E., Lincoln N., Norfolk E., Yorks S. W. en Sutherland E.

Katwijk aan Zee, 28 Sept. '25.

A. HAGEMAN.

Zonnedaaw-Vliegenvangertje. — Naar aanleiding van het stukje over de zonnedaaw in „Door het Rietland” schrijf ik u. Daar staat n.l. dat eenige jaren voor 1795 het geheim der vliegenvangertjes ontdekt is door een dokter uit Bremen. Maar nu las ik deze week juist in J. T. Martinet's „Katechismus der Natuur” het volgend onderschrift onder een plaatje van genoemde plant: „Is dan niet dit Vaderlandsche plantje de Zonnedaaw geen Vliegenvangertje”. Dit staat in 't vierde deel blz. 26.

Verder schrijft hij er nog iets over. Het is de tweede druk van het boek en gedrukt in 1779. En dan achter in het boek staat bij de aanmerkingen: 1ste dat het gebruikt wordt in de geneeskunde; 2de dat er twee vormen van zijn met ronde en met langwerpige bladen.


Ik dacht, dat u dat wel belangwekkend zou vinden daarom schrijf ik u dit.

Rotterdam, 22 Juni '25.

P. v. D. MEER.

Wie kan ondergeteekende helpen aan levend materiaal van *Blasia pusilla*, of desnoods aan Herbariumplantjes? Porto voor verzending wordt gaarne vergoed!

R. v. D. WILK, Goeman Borgesiuslaan, Helpman Groningen.



Monstruositeit van *Helicella virgata*.