

ongeveer 30 nestkastjes geplaatst. En thans na propaganda en mede onder invloed van een lezing voor onze verg. door den Heer G. Wolda Ornitholoog te Wageningen zijn er door eenige boomgaardbezitters 200 stuks gekocht om in de diverse boomgaarden op te hangen vooral om meezen te lokken. Er wordt nogal wat schade aangericht door appelbloesemkever en wintervlinder.

Elke maand hebben we een samenkomst, waar dan wat verteld wordt aan de hand van een serie lichtbeelden. Dergelijke avonden vallen erg in den smaak, en ook bij de volwassenen, die meer en meer belangstelling gaan voelen. Zoo komt er a.s. Dinsdag weer een ambtenaar van den Plantenziektenkundigen Dienst uit Wageningen voor ons een lezing houden in de Harmonie, waarvoor uitsluitend aan niet leden grootendeels fruitkweekers, reeds ruim 100 kaarten à 10 cts, in voorverkoop zijn uitgegeven.

Het uithalen van nesten is voor zoover ik beoordeelen kan, zeer verminderd. De jongens brengen veel bezienswaardigs aan. Onlangs werd ik gehaald door eenige arbeiders voor een bijzonderen vogel, die in 't Plantsoen gesignaleerd was. Omdat ik indertijd een opgezet exemplaar thuis had, afkomstig van Mr. Bernink uit Denekamp, herkende ik hem onmiddellijk als een Pestvogel. We hebben op sommige punten in ons stedeke ook den plantsoen-aanleg ter hand genomen en bloemperkjes aangelegd. Ook maakten we excursie in den omtrek. Op verzoek van sommige donateurs-enthousiasten heb ik opstellen met teekeningen over het Bosch en omgeving in locale bladen gelanceerd. De stoffelijke belangstelling daarvoor is niet evenredig aan het werk, zoodat ik hiermee gestaakt heb.

Ik meen U hiermee eenigszins op de hoogte gebracht te hebben van den stand van zaken en blijf na beleefde groeten. W. D.

Heksenbezems op Berken. — Algemeen wordt tegenwoordig aangenomen, dat de heksenbezem op berken, een bij ons zeer algemeen voorkomend verschijnsel, veroorzaakt wordt door een schimmel van het geslacht *Exoascus*.

Merkwaardig is echter, dat in veel gevallen aan deze heksenbezems verdikte knoppen voorkomen, die gewoonlijk grootendeels verdrogen en bedekt zijn met talrijke galmijten, die zich vooral tusschen de schubben ophouden.

Mijn vraag is nu nauwkeurig op te willen letten, of alle heksenbezems dergelijke knoppen vertoonen.

Gaarne zal ik van enkele exemplaren zonder verdikte knoppen, takjes ontvangen, speciaal van die, waarvan de *jonge blaadjes* min of meer *misvormd* zijn.

Bij twijfel sture men het geheele exemplaar. Ook enkele geheele heksenbezems (alleen *kleine* ± 20 cm. doorsnee) zonder verdikte knoppen zal ik gaarne ontvangen.

Port wordt vergoed.

Hoog Vensche Straat 10, Tilburg.

A. G. M. LIERNUR.

Coleoptera Neerlandica. — Nieuwe Naamlijst der in Nederland en het omliggend gebied voorkomende Schildvleugelige Insecten, door Jhr. Ed. Everts, Phil. Dr. Zutphen, W. J. Thieme & Cie., 1925.

In 1898 en 1903 verschenen de twee lijvige boekdeelen van de hand van Dr. Everts, den Nederlandschen coleopteroloog bij uitnemendheid, welke, onder den titel „*Coleoptera Neerlandica*” I en II, het standaardwerk vormden voor de studie der Nederlandsche Schildvleugelige Insecten. De ijver, waarmede het onderzoek dezer diergroep door velen in den lande, onder de hoofdleiding van Dr. Everts, beoefend wordt, maakte het een 15-tal jaren later, gezien de in dien tijd bereikte uitkomsten, uiterst gewenscht, dat een Supplement zou worden uitgegeven. Het heeft echter tot 1922 geduurd, alvorens dat Supplement, mede een lijvig boekdeel, de „*Coleoptera Neerlandica*” III, het licht heeft kunnen zien. De financieele steun van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen is daarbij van overwegend belang geweest.

Naast deze zeer omvangrijke Handboeken, is het echter voor de Coleopterologen van het grootste gewicht en gemak, indien zij beschikken over eene „Naamlijst”, die de namen der soorten met hare synoniemen bevat, zoomede die der verschillende variëteiten, rassen, aberraties, vormen enz., doch zonder de beschrijvingen, die men in de handboeken kan vinden.

Eene dergelijke Naamlijst was in 1906 verschenen, doch is deze sinds lang geheel

verouderd. Geen wonder dus, dat de Coleopterologen reikhalzend naar eene „Nieuwe Naamlijst” uitzagen! Gezien de hooge kosten, welke tegenwoordig aan de uitgave van wetenschappelijke werken verbonden zijn, verwachtte men, dat eene dergelijke lijst nog verscheidene jaren op zich zou laten wachten. Dat is echter gelukkig niet noodig geweest! De Firma W. J. Thieme & Cie. te Zutphen verklaarde zich bereid, de uitgave, en dat geheel voor eigen risico, tot stand te brengen en zij heeft zich daarvan gekwetend op eene wijze, waarover ik niets dan lof kan uitspreken. Het groot octavo deel ligt thans voor mij in keurigen, geheel linnen band, op deugdelijk papier met duidelijke lettersoorten gedrukt en met geruit schrijfpapier doorschoten. Dit laatste is voor eene dergelijke lijst onontbeerlijk, opdat men daarin alle naderhand bijkomende toevoegingen en aantekeningen op doelmatige wijze kunne aanbrengen.

Terwijl de Naamlijst van 1906 een getal van 3214 inlandsche soorten vermeldde, is dat getal in de Nieuwe Naamlijst 3591. plus nog eenige in de addenda vermelde ongeacht de soorten, welke nog niet in Nederland zijn aangetroffen, doch wel in de naaste omgeving, zoodat er veel kans bestaat, dat zij te eeniger tijd hier te lande ontdekt zullen worden. Die soorten zijn niet genummerd en dus niet medegemeld, hare vermelding is echter van veel belang voor de verzamelaars.

De Naamlijst zelve telt 127 bladzijden, ééne pagina Addenda en Corrigenda en een Register der Genera enz., alles te zamen 140 bladzijden.

Ik kan niet nalaten, de Nederlandsche Coleopterologen geluk te wenschen met de verschijning van deze uitgave, welke hun bejaarde, maar nog steeds uiterst energieke nestor in enkele maanden wist te voltooien, daarmede de kroon zettend op zijn omvangrijk wetenschappelijk werk. Aan de firma Thieme & Cie. komt welverdiende hulde toe voor haar initiatief en hare volmaakte coulantheid, waardoor een zoo welverzorgd geheel kon tot stand komen.

Schovenhorst, Putten (Veluwe),
14 Februari 1925.

Dr. J. TH. OUDEMANS,
President der Nederl. Entomologische Vereeniging.

Wilgbloei. — Naar aanleiding van het berichtje in het laatste nummer van De Levende Natuur over in Augustus bloeiende wilgen, herinner ik er hierbij aan, dat ik in den Vilen jaargang (blz. 214), een tekening van zoo'n proleptisch¹⁾ katje heb gegeven met een kort bijschriftje. Het toen afgebeelde katje vertoonde tevens galvorming, veroorzaakt door een galmijt (*Eryophies salicis*).

Het verschijnsel, dat *Salix amygdalinae* var. *triandra* den geheelen zomer door bloeiende is te vinden, gaf indertijd Host aanleiding om deze monstrositeit daarnaar steeds bloeiende wilg (*Salix semperflorens*) te noemen (1828).

Als verschijnsel staat het feitelijk op één lijn met het in den nazomer uitloopen van bladknoppen, die normaal hadden moeten blijven slapen tot het volgend jaar; maar die door invloed van het weer of door beschadiging van het uiteinde van den tak, reeds in den herfst gaan groeien. In den herfst ziet men nu en dan b.v. een bloeiend takje gouden regen; ook kastanjes doen het al heel vaak. Die van het Weesperplein in Amsterdam waren (zijn) er om bekend.

Eigenaardig, dat die proleptische wilgenkatjes altijd op een min of meer verlengden steel (tak) staan, welke eenige kleinere, soms bijna normale bladeren draagt.

Uit het bovenstaande volgt, dat we niet te doen hebben met een laten bloei, zooals de inzenders van het berichtje, de heer en Mevrouw Koopmans, veronderstelden, maar met een zeer vervroegden bloei. B. BOON.

Bevruchting bij Bruinwieren. — Het interessante artikel van Collega Sloff in de vorige afl. van De Lev. Nat. geeft mij aanleiding de aandacht van hem en van de lezers te vestigen op de volgende aanhaling uit het werk van den bekenden Algenkenner Prof. Dr. Friedrich Oltmans, die op bl. 223 van Bd. II van zijn „*Morphologie und Biologie der Algen*” (2de druk, 1922) zich aldus uitlaat:

„Zeitweilige Trockenlegung ist aber für den Austritt der Sexualorgane keineswegs uner-

¹⁾ Proleptisch = vóór vallend, d.i. vervroegd.