


verdwijnt. De buizerd gaat weer voort met zijn prooi te verslinden. We moeten nog over eenige slooten springen, voordat we op de strook grasland zijn, waar de buizerd zich bevindt. Als we over de eerste zijn gesprongen, bemerkt de buizerd ons en gaat de lucht in. Vlak boven ons blijft hij rondcirkelen. Een prachtig gezicht! We loopen nu naar de duif, die reeds opengescheurd is. Het voedsel in de krop is duidelijk te zien. Toen we een tijd later weer terugkwamen, was de duif verdwenen.

J. KIST.



Zeester met vier stralen.

Een merkwaardige zeester. — 5 December 1925 vond ik een kwartiertje beneden Kijkduin, te midden van een ontelbare menigte zeesterren, waaronder ook kam en slangsterren, een volkomen gave *Asterias rubens* met vier armen (zie foto).

Ik had toen ook gelegenheid me te verbazen over de groote makheid van een troepje (vermoedelijk (kleine strandloopers (*Tringa minuta* Leisler), dat gemakkelijk tot op 2½ meter was te naderen, terwijl ze toen nog van mijn persoon niet de minste notitie namen.

Vlaardingen, 14 Januari 1926.

P. HUMMELINCK.

Een trouwe klant. — In aflevering 2, jaargang 30, van dit maandblad meldde ik u de aanwezigheid van een kievit, die door zijne groote afwijking in kleur (bijna geheel wit) bijzonder opviel. Ook dit jaar is genoemde vogel wederom aanwezig en wel op het zelfde stuk land, waar het vorig jaar door het wijfje werd gebroed.

Gorredijk, 14 April 1926.

A. DUNANT.

Klein Waterhoentje. — Ik lees nog al eens in „het Vogeljaar” en „het Vogelboekje” en daar zie ik ook in, dat het klein en kleinst waterhoentje nog al zeldzaam zijn. Nu heb ik hier bepaald een van beiden gezien.

Ik woon hier heel afgezonderd in den polder en bij mijn huis is een Nortonput, waaruit het water in een sloot stroomt en daar blijft bij streng winterweer steeds een flink wak.

Daar is twee dagen aan elkaar, ik meen op 18 en 19 Januari, het waterhoentje geweest. Ik had het gemakkelijk kunnen vangen, het was niet erg schuw en bij mijn naderen school het weg onder een overhangenden graskant, maar ik heb alleen getracht één zoo duidelijk mogelijke beschrijving te verkrijgen:

Snavel ongeveer zoo lang als de kop, spits, kleur zwart of donkerbruin, keel (hals), borst en buik blauw grijs (leigrauw), stuit lichter zoo wat wit, nek en rug bruin met donkere stippen of streepjes, pooten geel bruin. Overigens had het alle manieren in het zoeken langs den kant, zoowel als in het zwemmen, precies zooals het gewone waterhoentje, het had niet zooveel witte veertjes aan de zijden als het waterhoentje. Ook kon het nog beter op de vleugels komen en scheen mij een zeer goed vlieger. De groote kan ik moeilijk schatten, iets kleiner dan een watersnip, zoo iets als een spreeuw of iets groter. Het was een heel mooi gezicht, dit kleine beestje bezig te zien.

Grebolder, Schoorlham.

JN. WILDEBOER.

GEVRAAGD:

H. Schlegel. De Vogels van Nederland; Heimans en Thijssse. In het Bosch; Dr. J. P. Thijssse. Omgang met Planten; Dr. Oudemans. De Nederlandsche Insecten; Ardea 3-7, 11-13. De Levende Natuur, jaargang 20-24.

Aanbieding met opgaaf van staat en prijs aan H. HOOGENDOORN, Postbox 16, Oudewater.

AANGEBODEN:

Eiervverzameling ter overname aangeboden. Type-collectie. ± 800 exemplaren, inlandsche en eenige buitenlandsche subspecies, in ± 100 soorten. Vele zeldzaamheden. In groote triplexhouten doozen. Volledig geëtiketteerd met datum, vindplaats etc. Collectie in uitstekenden, gaven toestand.

Eventueele aanvragen te richten tot FR. HAVERSCHMIDT, Kromme Nieuwe Gracht 50, Utrecht.