

leek het me gewenscht, er een afbeelding van te laten zien; ik zag van beide soorten echter vele vroeger gevangen exemplaren. *P. parvipennis* schijnt speciaal langs de kust voor te komen.

Psylla hartigi Flor. III. Hier en daar gewoon, o.a. op berk. Juni-Juli. Deze soort schijnt elders in ons land slechts sporadisch voor te komen. Zij heeft meer gelijkenis met andere *Psylla*-soorten dan de voorgaande; de zeer dicht staande voorvleugeloppervlakte-bedoorning is het meest opvallende kenmerk. De kleur is iets constanter, veelal fraai oranje.

Psylla mali Schmiedb. I. Op Meidoorn, zeer veel. Juni-Oct.

Psylla foersteri Flor. VII. Bierlap, 1 ♀, op els. Aug.

Psylla hippophaes Foerst. II. Uiterst algemeen op duindoorn. Juni-Oct.

Voor hen die wat nader met de bovengenoemde dieren willen kennis maken, volgen hier eenige aanwijzingen omtrent litteratuur. Ter eerste orientatie: Dr. J. Th. Oudemans, Nederlandsche Insecten (met determineerlijsten tot families). — Brohmer, Fauna von Deutschland (alleen determineerlijsten, tot genera). — A. Lameere, Faune de Belgique (ook alleen determineerlijsten, tot op de soorten, doch bewerkt voor België, en niet volledig, voor beginners echter zeer bruikbaar).

Voor wantsen: S. C. Snellen v. Vollenhoven, Hemiptera Heteroptera Neerlandica, niet zeer betrouwbaar, en evenmin volledig. Zie voor verbeteringen: Tijdschrift v. Entomologie. Deel XXVI en XXVIII (publicaties van A. J. F. Fokker). — Bezig te verschijnen is: W. Stichel, Illustrierte Bestimmungstabellen der Deutschen Wanzen, goed, maar nog al duur. Voor Cicaden: Melichar, Cicadinen von Mittel-Europa.




Fig. 11. *Psylla hartigi*. $\times 20$.

Sinds het ter perse gaan van dit artikel, werden nog 7 soorten Hemiptera in ons gebied verzameld; n.l. *Orthocephalus saltator* Hahn; *Megaloceraea* (*Trigonotylus*) *ruficornis* Fourcr.; *Pithanus maerkeli* H.-S.; *Aphanus* (*Graptopeltus*) *lynceus* F.; *Berytus crassipes* H.-S.; *Sehirus luctuosus* M.R. en *Psylla nigrita* Zett.

Volgens de juist-verschenen aflevering van Stichel's tabellen moet *Eremocoris erraticus* F.: *E. abietis* L. heeten; evenzoo: *Gastroles ferrugineus* L. = *G. grossipes* d. G.; *Metacanthus elegans* Curt = *M. punctipes* Germ. *Phyllontocheila ciliata* Fieb heet thans: *Tingis* (*Lasiotropis*) *reticulata* H.-S., terwijl de naam: *Monanthia echii* niet van Wolff doch van Schrank afkomstig moet zijn.

H. C. BLÖTE.

Nieuwe (?) euveldaad van de huismusch. — De huismusschen zijn m'n grootste vrienden niet vanwege hun bijzondere voorkeur voor de erwten in mijn tuin. Maar dezer dagen heb ik hun waardecijfer ± 5 toch nog met één punt verminderd.

Nadat omstreeks Paschen mijn eenigste kerseboom was beginnen te bloeien, lagen de volgende dagen honderden witte bloemen onder den boom; alleen de bloemsteel en 't vruchtbeginsel was achter gebleven. Aanvankelijk beschuldigde ik een klein snuitorretje van deze nietgewenschte bloemenplukkerij, maar spoedig zag ik beter. Enkele musschen waren in den boom bezig de bloemen doormidden te bijten. De steel bleef zitten, de rest — behalve 't vruchtbeginsel — kwam naar beneden dwarrelen. Om dat vruchtbeginsel was 't den dieren blijkbaar te doen. En 't ging vlug, of ze 't jaren hadden gedaan. Ik heb 't andere jaren nooit opgemerkt. Kennen alleen de Herwensche huismusschen dit kunstje of heeft men dit ook elders waargenomen?

L. W. SCHOLTEN.