

100. Kievit (*Vanellus vanellus*): broedvogel; vrij algemeen; op den trek vaak in groote troepen in de weilanden; in 't najaar '25 zelfs op den esch, onmiddellijk bij de stad, gezien.
101. Kemphaan (*Philomachus pugnax*): broedvogel; Moorven bij Buurse.
102. Tureluur (*Tringa t. totanus*): broedvogel; op de venen.
103. Grutto (*Limosa l. limosa*): broedvogel; op de venen; ook bij 't Lonnekermeer.
104. Wulp (*Numenius a. arquata*): broedvogel; Aamsveen; Moorven; omtrek Lonnekermeer en Lonnekerberg, en meer plaatsen.
105. Watersnip (*Gallinago g. gallinago*): veel op den trek; ook broedvogel, b.v. op 't Aamsveen.
106. Houtsnip (*Scolopax r. rusticola*): op den trek.
107. Bokje (*Lymnocyptes minimus*): op den trek; Aamsveen.
108. Zwarte stern (*Chlidonias n. niger*): een troep aangetroffen op 't Moorven, druk jagend, en tevens boven 't Lonnekermeer.
109. Waterral (*Rallus a. aquaticus*): op den trek; in 1924 geschoten op 't Moorven.
110. Waterhoen (*Gallinula c. chloropus*): broedvogel; o.a. in spoorsloten, 't Lonnekermeer.
111. Meerkoet (*Fulica a. atra*): broedvogel; in groot aantal op 't Lonnekermeer.
112. Korhoen (*Lyrurus t. tetrax*): broedvogel; Aamsveen; Moorven.
113. Boschfazant (*Phasianus colchicus*): broedvogel.
114. Patrijs (*Perdix p. perdix*): broedvogel.
115. Kwartel (*Coturnix c. coturnix*): stellig broedvogel; heel zeldzaam; op de esschen.
116. Kraanvogel (*Megalornis g. grus*): geregeld op den trek waar te nemen.

Enschede.

H. J. HOGESLAG.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Zwarte bladluizen gevraagd. — Studie makend over de biologie en systematiek der zwarte bladluizen, zou ik gaarne van de abonné's van dit blad levend materiaal dezer dieren ontvangen. Vooral zwarte luizen van *Viburnum opulus*, *Philadelphus*soorten, *Solanum nigrum*, Schermbloemigen en Zuringsoorten zijn voor mij van groote waarde. Volgaarne worden desgewenscht de portkosten vergoed.

Wageningen, Kapelstraat 7.

Ir. C. FRANSSEN, l.i.

De Hop in de Duinen. — Woensdag 11 Augustus waren wij in de Bloemendaalsche duinen, toen plotseling een vrij groote kleurige vogel dwars over den weg vloog. Hij streek neer in een berkje, vlak langs den weg, een meter of tien van ons af en bleef daar eenige oogenblikken zitten. Het was een prachtige hop en als of hij de herkenning wilde vergemakkelijken, hield hij zijn kuif hoog opgericht en uitgespreid. Er was nog een tweede vogel bij, maar die verdween snel onder de duindoorns, zoodat we niet met zekerheid kunnen zeggen, wat dat voor een dier was. T.

Waar zijn de Wespen? — Hier in Bloemendaal is haast den heelen zomer geen wesp te zien. Ik bedoel de gezellig levende wespen, het geslacht *Vespa*, de bewoners en bouwers van de wespennesten. De mooie breedbladige wespensorchis staat bij honderden heerlijk te bloeien, maar wacht tevergeefs op zijn bestuivers. Uren lang heb ik bij de bloemen doorgebracht, zonder een enkele wesp te zien. Zoo kunnen de kansen verkeeren. Denk nog maar eens aan 1921, toen we die wespensplaag hadden. T.

De Anachronismen van 1926. — Op 't oogenblik staat in mijn tuin de gewone Kerstroos (*Helleborus niger*) lustig te bloeien. Eigenlijk mag hij dat pas in November doen. T.