

Ondanks dit alles is het mij niet mogen gelukken, den *grooten lijster* in deze streken te constateeren. Of deze vogel er voorkomt zou ik niet kunnen zeggen. Wel trof mij, dat in deze dennewouden de *wielewaal* vrij veel voorkomt. Ook de *fluiter* heb ik er gehoord met zijn typische reeks van toontjes. Op de weilanden komt hier en daar de *kievit* in gezelschap van *grutto* en *tureluur* voor, doch niet talrijk; daarnaast nog op de heide de *wulp*. De *grauwe klauwier* schijnt mij toe, ook vrij veel voor te komen, evenals de *koekoek*, die in bijna ieder boschje zijn roepstem doet klinken. Een typisch verschijnsel van het Oosten des lands is de *kuifleeuwerik*, die vaak als de musschen op den rijweg wandelt, zooals hij bij ons alleen soms in den winter doet. Ook de *ekster* komt vrij veel voor. Vaak zit in den zwiependen top van een populier voor een boerderijtje de dikke nestklomp van onzen langstaart. In een der dennenbosschen trof ik een paartje *zwartkopmeezen* met voeder bij het nest aan, in een ander een familie *zwarte meesjes*, die onder vroolijk „siet, siet” hun weg door de takken zochten. Van die roofvogels heb ik alleen gezien de *torenvalk*, die hier en daar boven hei- of weiland staat te bidden. Vaak loopen *patrijzen* hier en daar, vooral waar in de nabijheid eenig struikgewas staat. Tenslotte nog iets over den *ooievaar*. Ik noteerde in een betrekkelijk kleinen kring om Assen drie broedende nesten n.l. bij *Ter Aard*, *Schieven* en *Exloo*. Men vertelde mij, dat er verscheidene horsten waren, waar dit jaar niet gebroed werd en dat daaronder enkele voorkwamen, die vorige jaren bewoond waren geweest en waar dit jaar de ooievaars zich slechts vertoond hadden en niet tot broeden waren gekomen. Misschien heeft dit eenige waarde voor het *ooievaarsonderzoek*.

De omstreken van Assen kwamen mij voor rijk aan natuurschoon, schilderachtig en goed toegankelijk voor den natuurliefhebber; daar naar mijn meening nog weinig is geschreven over dit interessante gebied heb ik bovenstaande geschreven. Ik houd mij gaarne aanbevolen voor meer gegevens over deze mooie streek van ons land. Ik heb slechts een oppervlakkig overzicht van de resultaten van een korte, welbesteede vakantie willen geven.

Den Haag, 12 Juni.

PH. ENTERS.

Reigers in Nederland. — Naar aanleiding van de reigertelling in „De Levende Natuur” van 1 April '27 deel ik U mede, dat bij den heer C. Bruynzeel te Voorburg 6 reigers nestelen en dat de kolonie bij Wassenaar \pm 120 paar telt.

Leiden, 8 Juni 1927.

E. DE RAADT.

Texelsche Aanteekeningen. — De koekoek riep op Texel nog op 20 Juli. Leeuwerik, pieper en kneutje zijn aan de Koog nog in vollen zang, 's morgens zelfs gedurende zwaar stormweer met slagregen. Duinpiepers zijn op Texel nog lang niet zeldzaam; wij zagen de prachtige geelbruine vogeltjes in de lage buitenduinen bij paal 18, paal 20 en paal 23. In de Buiten-Mui tusschen paal 21 en 22 zong op 22 Juli 's middags om vier uur de sprinkhaanrietzanger dat het een lust was. De strandduintjes tusschen paal 23 en 24 zijn thans een bezitting van de stormmeeuwjes. Het enkele broedpaar van een jaar of zes geleden is nu aangegroeid tot een flinke bevolking. Toen wij er 20 Juli wandelden waren er voortdurend een kleine twintig in de lucht, die ons vergezelden met hun aangenaam helder en hoog geroep. Zij vielen ons niet aan, trouwens wij deden geen moeite om naar jongen te zoeken. Er liepen ook veel bontbekpleviers rond. Deze strandduintjes aan den ingang van de Slufter vormen een zeer onderhoudend geheel. De vlakke van den Kleinen Slufter is weer veel groener dan vorige jaren; zand en slib gaan bijna geheel verborgen onder Engelsch Gras, Zeemelkkruid, Zeespurrie en Zeekraal. Merkwaardig is het, dat hier geen spoor van duinvorming te ontdekken valt, terwijl die toch vlakbij in vollen gang is.

De bloemenrijkdom van de Buiten Mui blijft even bewonderenswaardig als te voren. Zeer mooi zijn de kleine heuveltjes, begroeid met duindoorns en onder die dorren dicht opeen de bloeitrossen van het Wintergroen. De Tengere Bastaardmuur, *Anagallis tenella*, bedekt heele uitgestrektheden, al wordt zij aanvankelijk tusschen de lage bloembiesjes over het hoofd gezien. Op de vele duizenden moeras-wespenorchissen was geen enkele wesp te zien. De *Parnassia's* hadden nog al druk bezoek en wel van weekschildkevers,