

Vervolgens moet nog genoemd **ESBEN PETERSEN.**

„Neuroptera Danica, Planipennia” in Entom. Meddel. II, 3, p. 26—33, 1906 en supplement p. 305 en 306, 1910 (Deensch!).

Over de in Noord-Amerika voorkomende gaasvliegen, zie men:

NATHAN BANKS, „A revision of the Nearctic Chrysopidae”, in Trans. Entom. Soc. 29, p. 137—162; 1903.

Januari 1927.

H. A. BAKKER.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Mierentabel. — Van Dr. Stärcke's Mierentabel zijn nog eenige overdrukken beschikbaar. Ze wordt u toegezonden op ontvangst van een postwissel groot f 1.— of storting van een gelijk bedrag op postgiro 16373 Jac. P. Thijsse, Bloemendaal. T.

Kruisbekken. — Sedert de eerste dagen van Juli vertoonen zich weer kruisbekken in ons land. Hier in Bloemendaal zagen wij tot 16 Juli dagelijks troepjes van 3—9 stuks. Op Texel werd 26 Juli een dood wijfje gevonden. Ze zijn lang zoo talrijk niet als in 1909 maar toch zullen onze lezers ons genoeg doen met de mededeeling van hun waarnemingen. T.

Stofzaad. — Het eerste behaarde exemplaar van Stofzaad vond ik 8 Augustus onder beuken, een flinke plant met drie forsche stengels. Er bloeiden toen ook nog onbehaarde stofzaadplanten, maar de meesten waren al in vrucht en stonden languit recht op in het bosch.

Heden (13 Aug.) vond ik weer twee planten met behaarde bloemen en korte meeldraden, pas in bloei, ditmaal onder dennen, te midden van uitgebloeiende onbehaarden. Wel merkwaardig, dat de twee zoo duidelijk verschillende vormen dezelfde standplaats hebben. T.

Stonehenge. — De omgeving van het wereldberoemde voorhistorisch monument Stonehenge op Salisbury Plain wordt thans reeds ontsierd door allerlei bouwsels en er dreigen er nog meer te komen. Nu heeft zich een comité gevormd om den steenenkring te bevrijden en een waardige ruime omgeving te verschaffen, even indrukwekkend als van ouds. Daartoe moet een terrein van 700 à 800 H.A. worden aangekocht en dat zal 35000 pond sterling kosten. Het zal wel lukken, want Ramsay Macdonald, Lord Crawford en Lord Gorey of Falloden verleen hun steun.

Hebben onze hunebedden een waardige omgeving? T.

Het ophoogen van nesten door moerasvogels. — In British Bords vertelt de heer Haverschmidt dat hij in Holland een nest van de grutto vond in een graspol in een plas. Door aanhoudenden regen steeg het water en nu hoogde de grutto zijn nest op, zoodat de eieren droog en warm bleven. Toen het water weer daalde tot zijn oorspronkelijk niveau, was het nest op zijn minst 20 cM. boven de oppervlakte. T.

Geelgors in zanglijsternest. — Op 2en Pinksterdag, 6 Juni, werd mij tusschen Putten en Ermelo (Vel.) op een zanglijsternest gewezen. Bij nader onderzoek bleek het een oud nest van een zanglijster te zijn, dat door een Geelgorzenpaartje in beslag was genomen om te nestelen. Ik vond er namelijk een dood jong in, dat niet ver van volwassen toestand af was en dat ik direct als een Geelgorzenjong herkende aan den snavel en de al goed ontwikkelde kleuren. Iemand in de buurt vertelde me, dat hoogstwaarschijnlijk de andere jongen uitgevlogen waren op 5 Juni en dit doode jong een achterblijvertje was, dat door de ouders in den steek was gelaten. Het nest lag op $2\frac{1}{2}$ M. hoogte tusschen den stam en een tak. Van binnen was het bekleed met takjes van een Thuja, waarin het nest ook lag. Terzelfder tijd ontving ik een nest van een merel, die ook gebruik had