

Renvogel. — De eenige vondst van de Renvogel sedert 1877, waarop Dr. Eykman in zijn waardevol artikel in de vorige afl. (blz. 252) doelt, moet betrekking hebben op het exemplaar van den heer I. van Stegeren uit Groningen, dat op 20 Nov. 1909 gevangen is bij Faan, Gemeente Oldekerk. Het exemplaar is thans nog in het bezit van den zeer bejaarden heer v. S. zelf, die toegezegd heeft, dat het later met zijn heele collectie zal overgaan in bezit van het Zoöl. Laboratorium van de Rijks Universiteit te Groningen.

A. A. VAN VOORN.


Kraanvogels. — Einde October streken op een weiland nabij Borne een vijftigtal kraanvogels neer, blijkbaar wegens vermoeidheid. Zij zochten geen voedsel. Op naburig gerucht gingen zij weer spoedig op de wieden in zuidelijke richting. Volgens mijn zegsman, een betrouwbaren jager, is dit een jaar of zes geleden ook daar eenmaal waargenomen.

Hengelo.

Ir. A. C. SCHWELERS.

De Godsvisch of Koningszalm. *Lampris luna* (Gm). — Den negenden Augustus werd ik gewaarschuwd, dat een vreemde visch was aangespoeld. 's Morgens om 5 uur was het

dier nog levend door een Scheveninger gevonden ongeveer tegenover den vuurtoren. De man bracht het dier naar de vischafslag die vlak bij den vuurtoren aan den haven gelegen is en vond er al gauw een koper voor. Op aanraden van een belangstellend Hagenaar werd de visch naar het slachthuis vervoerd om ingevroren te worden. Ik spoedde me naar het abattoir en determineerde het dier als Koningsvisch of Godszalm (*Lampris luna* (Gm)). Het is een pracht van een dier. Het eerste wat opvalt is de schitterende kleur. De vinnen zijn koraalrood. Het lichaam is geheel bedekt met zéér kleine schubjes. Aan de bovenzijde van het lichaam zijn deze diepblauw van kleur, naar de eigenaardig gebogen linea lateralis lichter verloopend. Onder deze lijn gaan ze in zacht rood over, terwijl de onderzijde weer fraai rood gekleurd is. De los opliggende schubben laten bij geringe aanraking al los. Dan komt de huid met witgele vlekken, die ook al hier en daar door de schubben heen zichtbaar zijn, te voorschijn. De borstvinnen zijn eigenaardig ingeplant (zie foto) en opwaarts gericht. De staart „met handvat” doet aan makreel en tonijn denken. De visch behoort tot de familie der Glansvissen.



De Godsvisch of Koningszalm.

DELORME.

Watersnip. — Bij het bestudeeren der lijst van Ned. Steltloopers in het December-nummer van De Levende Natuur, viel het mij op, dat daarin onder de plaatselijke benamingen van de „watersnip” niet voorkomt de naam, die hier in den Achterhoek aan dezen vogel wordt gegeven. Hier draagt hij n.l. algemeen den naam „ronnekemère”. „Ronneken” is het geluid, dat een merrie maakt, als ze den tijd gekomen vindt om op stal te worden gezet, opdat het veulen kan zuigen. Een „mère” is hier de benaming voor een merrie. Dat deze naam meer voorkomt, blijkt ook uit pag. 196 van het pas verschenen werk van H. W. Heuvel: „Oud-Achterhoeksch Boerenleven het heele jaar rond”.

Eibergen, 10 Dec. '27.

G. C. TIECKEN, Hoofd der O. L. S.

Kruisbekken. — Als vervolg op de berichten over het voorkomen van kruisbekken in ons land, kan het volgende dienen: In de boomgaarden tusschen Nieuw- en St.-Joosland