

operatie, eindexamen en buitenlandsche reis heb ik heelemaal vergeten verder nog wat op te letten. Voor ik het vergeet, wil ik u die paar gegevens nog sturen.

Rana esculenta zeer algemeen in het Treekermeertje. Ook gevonden ten N. en ten O. van Utrecht (Ezeldijk; Blauwkapel; Biltse Fort).

Rana temporaria zeer algemeen rondom Utrecht; *niet* gevonden in het Treekermeertje. Achter het Vossegat (langs de Kromme Rijn) heb ik geen *Rana esculenta* gevonden. We tennisten daar altijd, zoodat ik met vrij groote zekerheid, althans van de slootjes bij de baan kan zeggen, dat er geen *Rana esculenta* voorkomt. Ik zal probeeren volgend jaar wat vollediger gegevens te verzamelen, ook wat betreft padden. Hopenlijk is het mogelijk onder de N. J. N.-leden alhier wat meer vuur voor deze enquête te krijgen.

Utrecht.

M. RUTTEN.

Wie weet het? — Mag ik U eens vragen, wat de oorzaak kan zijn, dat mollenvangers alleen mannetjesmollen, nooit of althans zelden vrouwtjes vangen?

Een tuinbouwcurist vroeg me dit, hij had 't vaak onderzocht, maar — ik wist er geen antwoord op, dat hem bevredigde: dat de vrouwtjes steeds dieper in den grond zaten, geloofde hij niet (ik feitelijk ook niet), en hij kon goed zien, wat een mannetje is. A. KOOL.

De Bonte Kraaien. — Op de vraag van U in De Levende Natuur, van 1 Jan. j.l. over de bonte kraaien, meld ik U. dat ik te Wildervank niet heb bemerkt, dat het kraaienaantal minder was dan de vorige jaren. Ook op de avondtrek naar de slaappleatsen in de bosschen te Anloo waren evenveel bonte kraaien als de vorige jaren.

Utrecht, Maliesingel 41.

A. DJ. F. FEENSTRA.

Vogels van het Strand. — In de Collectie van mijn vriend en medewerker, den Heer G. A. L. Bisseling, alhier, bevindt zich een exemplaar Kleine Alk ♂ (Alle alle L.) dat op 19 Januari '28 langs het strand ten N. van Kijkduin werd gevonden.

Omstreeks dienzelfden tijd werd aldaar nog een dergelijk exemplaar zonder kop aangetroffen.

Ook bevindt zich bij bovengenoemde verzameling een exemplaar Kleine Zeemeeuw (*Larus canus* D.) ♂ juv. dat op 3 Januari '28 langs het strand te Scheveningen werd gevonden met ring gemerkt P. Skovgaard Viborg, Danmark, No. 4176.

Na correspondentie bleek, dat het exemplaar geringd was op het eiland Saltholm bij Kopenhagen op 7 Juli '27.

Voorts dient opgemerkt te worden, dat van de geringde rechterpoot, zool, teenen en zwemvliezen gezwollen waren.

's-Gravenhage, Vaillantlaan 84.

M. J. TEKKE.

Zeldzame broedgevallen in het Boertanger Veen. — De Januari-aflevering van de steeds belangwekkende tweemaandelijksche „Beiträge zur Fortpflanzungsbiologie der Vögel” (Ludw. Schuster, Berlin-Südende, Hermannstrasse 15) bevat een tweetal ook voor ons land merkwaardige berichten, n.l. omtrent het broeden van *de Poelsnip* (*Capella media* Lath) en *het Kleinste Waterhoen* (*Porzana pusilla* interm.) in het Boertanger Veen. Van den eerste werd 15 Mei 1927 door H. Schlotter een nest met drie eieren gevonden, dat zeer goed verborgen in een zeggenpol zat; van boven was het schier onzichtbaar en slechts de zijdelingsche ingang verraadde 't geheim van den snip. De omgeving was tamelijk moerassig en dicht begroeid met droog zeggegras. Daar dit uitgestrekte — door Nederlandsche natuurliefhebbers zeker nog weinig bezochte — veengebied aan beide zijden van de Duitse grens ongeveer tusschen Bellingwolde en Emmercompascuum ligt, moge de aandacht op deze belangrijke vondst gevestigd worden, want het is niet onwaarschijnlijk, dat daar de poelsnip ook wel op Hollandsch gebied huizen zal. Volgens Snouckaert's Avifauna Neerlandica 1908 zou de soort misschien vroeger in gering aantal in Friesland, Groningen en N. Brabant gebroed hebben. Thans staat zij echter reeds lang niet meer als zoodanig bekend en is zelfs op den trek zeldzaam te noemen.

Dezelfde correspondent (H. Schlotter) ontving voorts van een jager twee door hem in voornoemd veen gevonden eieren van het kleinste waterhoen. Het nest stond boven den waterspiegel van een „Sumpfteich” en was niet overdekt.