


VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Mierentabel. — Van Dr. Stärcke's Mierentabel zijn nog eenige overdrukken beschikbaar. Ze wordt u toegezonden op ontvangst van een postwissel groot f 1.— of storting van een gelijk bedrag op postgiro 16373 Jac. P. Thijsse, Bloemendaal. T.

Makke Meezen. — Bijgaand kiekje van een meesje is door mij gemaakt gedurende de 2e sneeuw- en vorstperiode die wij hier in den Haag meemaakten. 's Morgens om 10 uur begaf ik mij naar „Marlot" gewapend met fototoestel en pinda's. Ik kreeg achtereenvolgens een stuk of zes meezen te gast om een pinda uit mijn hand te snoepen. Nu hield ik op mijn linkerhand het meesje en met mijn toestel, voorzien van een portretlensje onder mijn rechterarm, maakte ik een momentopname van $\frac{1}{25}$ sec.



Den Haag, 26 Januari '28. P. H. BOUTER.
P.S. Ik lokte de vogels door fluiten.

De Muskusrat. — Naar aanleiding van de alarmeerende berichten over groote schade, die de bisamrat zou hebben aangericht in boomgaarden in de Rijnstreek, welk bericht tot gevolg heeft gehad, dat in verschillende bladen in Nederland artikelen over het van de bisamrat voor ons land dreigend gevaar zijn verschenen, is in Duitschland geïnformeerd naar de juistheid van dat bericht en naar de verbreiding, die de bisamrat op dat oogenblik heeft.

Prof. Dr. E. Schaffnit, directeur van het Instituut voor Plantenziekten aan de Landbouwhoogeschool te Bonn deelt ons mede, dat het bedoelde bericht volkomen onjuist is. De bedoelde schade werd niet veroorzaakt door de bisamrat, maar door de gewone woelrat (*Arvicola amphibius*), welk knaagdier ook bij ons meermalen boomwortels afknaagt. Door Prof. Schaffnit's vriendelijke bemiddeling ontvingen wij ook bericht van dezelfde strekking van de Biologische Reichsanstalt. Uit het daarbij gevoegde kaartje blijkt, dat de het dichtst bij de

Nederlandsche grens gelegen plaats, waar de bisamrat in Duitschland tot nog toe waargenomen is, nog altijd ruim 250 K.M. van onze grens verwijderd ligt, nl. nabij Magdenburg.

Ook de Rijkslandbouwconsulent te Berlijn, Ir. A. H. Joustra, heeft zich met het doel, nadere gegevens te verkrijgen, met de Biologische Reichsanstalt in verbinding gesteld; in overeenstemming met het bovenstaande deelde men hem daar o a. mede, dat de westelijke grens van het verbreidingsgebied van het dier ongeveer getrokken kan worden van Stendal (ten N. van Magdenburg) over Erfurt naar Schweinfurt (ten N. van Würzburg).

Wij kunnen er dus wel gerust op zijn, dat vooreerst nog geen gevaar dreigt voor een invasie van de bisamrat vanuit Duitschland

In sommige bladen is ook een bericht gepubliceerd over een mogelijker wijze reeds aanwezig zijn van de bisamrat in Nederland, en wel te Zeegse.

Voor zoover dit thans is na te gaan heeft men daar vermoedelijk met zeer groote exemplaren van de gewone bruine rat (*Mus decumanus*) te doen gehad. Mede in verband met den grooten afstand, waarop het dier nog van Nederland verwijderd is, is het in de