

**Maaginhoud van Steenuil en Sperwer.** — In de maag van een op 5 Maart 1928 verongelukte steenuil ♀ vond ik 11 rupsen van de Huismoeder of Hooivlinder (*Agrotis Pronuba*) benevens 1 Duizendpoot.

Op 10 Maart j.l. ontving ik Sperwer ♂, die zich bij de vervolging van een Musch tegen het glas van een broeikas had doodgevlagen. Krop en maag bevatten vogelresten o.a. 2 paar pooten, 1 ondersnavel, 2 hartjes, 2 magen en een oog. Na een zeer nauwkeurig onderzoek bleken dit resten te zijn van een Musch (*Passer domesticus*) en een Winterkoninkje.

G. A. L. BISSELING.

**Een Kraai op de Vlindervangst.** — Toen ik de bewegingen van een Zwarte Kraai op een weiland door den kijker volgde, zag ik hoe hij bij nadering van een Koolwitje (*Pieris Brassicae*) deze trachtte te grijpen. De vlinder ontsprong den dans en fladderde voorbij, maar werd door de snel stappende Kraai achtervolgd en gegrepen. Dit hapje was blijkbaar voor de jongen bestemd, want hij vloog er mede weg.

Ook dit jaar vond ik weer eenige Kievitseieren en Gruttoeieren, die kennelijk door een dezer zwarte roovers waren leeg gegeten.

G. B.

**Een kievitnest met 5 eieren.** — Hierbij zend ik UEd. een foto van een kievitnest met vijf eieren. Het komt niet vaak voor, maar met dit nest is 't toch nog iets bijzonders ook, zooals blijkt uit het volgende:



Het kievitnest met vijf eieren.

Ongeveer 4 weken geleden zat een kievit op een akker te broeden. (Deze kievit was zeer tam zij liet mij steeds naderen tot een afstand van ongeveer 16 Meter.)

Een week later moest de akker geploegd worden en nu werd 't voor de kievit een critieke toestand. Het nest moest nu uit den weg. Eerst wat naar den kant en dan maar over 't kleine slootje. Het ging goed, de kievit zat er op en toen wij den kant moesten ploegen heb ik 't nest over 't slootje gelegd en nu afgewacht.

Dit was zeker te veel verlangd de kievit scharfelde wat rond in de nabijheid, doch broeden kwam niets meer van. Nadat de akker geploegd was, het nest weer op zijn oorspronkelijke plaats teruggebracht, maar alles te vergeefs.

Eenige dagen later kwam ik nog eens langs het nest en bezag het nog eens met een spijtig gevoel. Om eens te kijken hoe lang de eieren bebroed waren, klopte ik er één stuk en wierp 't weg.

Het nest bleef liggen met drie eieren. In 't laatst van deze week kwamen wij werken in de nabijheid en zagen een kievit wegvliegen van 't oude nest en zagen nu vijf eieren in plaats van drie. (Deze kievit is zeer schuw). Vermoedelijk is het dus niet de eerste kievit die na een onderbreking teruggekomen is. Nu is de vraag: „Zou één kievit ooit meer dan vier eieren leggen?”

Het is n.m. al eens meer voorgekomen dat hier in de buurt vijf kievitseieren in één nest lagen welke ook niet door dezelfde vogel gelegd waren.

J. WILDEBOER.

**Moerasschildpad.** — In aansluiting bij mededeelingen omtrent het voorkomen van de moerasschildpad in de omgeving van Druten, blijkens uw blad van 1 Febr. 1928, deelt ondergeteekende mee, dat ook in de Hoogeveensche vaart een moerasschildpad gevangen werd. Het wordt zeer waarschijnlijk geacht, dat dit exemplaar in deze omgeving ontsnapt zou kunnen zijn.

Hoogeveen.

L. V. D. ZWEEP.