

Coelioxys quadridentatus L. — 2 ♀♀ in Juli '23, een in Meijendel op 't zand en één in de Sprank op *Echium*. Staat bekend als koekoeksbij van *Megachile circumcincta* en *willughbiella*, waarvan de eerste ook in het gebied voorkomt.

Coelioxys mandibularis NIJL. — Niet zeldzaam in Juni en Juli in Bierlap, Kijfhoek en t. O. hiervan. De soort vliegt vooral op *Rubus* en is bekend als koekoeksbij van *Megachile argentata*. In 1926 2 ♀♀ t. W. van de Sprank gevangen.

Coelioxys acuminatus NIJL. — 1 ♀ 21 Juli '23 op 't zand, en 1 ♂ 2 Aug. '23 op *Rubus*, beide in Bierlap. Volgens Alfken waarschijnlijk koekoeksbij van *Megachile centuncularis*, die daar echter nog niet gevonden is.

Stelis ornatula KLUG. — Slechts in Kijfhoek gevonden, 1 ♂ 1 Juni '25, 2 ♂♂ en 1 ♀ 1 Juli '26, op het zand. Koekoeksbij van *Osmia leucomelaena* K.

Van de hierboven genoemde soorten zijn de volgende „nieuw” voor Nederland, een gedeelte ervan is ondertusschen reeds als zoodanig gepubliceerd: *Homonotus sanguinolentus* F., *Psammophila luffii* SAUND., *Miscophus maritimus* SM., *Crabro pubescens* SHUCK. var. *inermis* THOMS. 1), *Oxybelus argentatus* CURT. en *Halictus tarsatus* SCHCK.

Het materiaal werd verzameld door de heeren Dr. J. G. Betrem, H. C. Blöte, H. C. L. v. Eldik, J. Sonneveldt, D. de Vries, C. A. G. Wiersma en door mij zelf.

Tot slot dank ik degenen, die mij op een of andere wijze bij het bewerken van het materiaal behulpzaam waren, namelijk de heeren J. D. Alfken te Bremen, P. Blüthgen te Naumburg, B. E. Bouwman te Bilthoven, (die zoo vriendelijk was, mij ook de foto's af te staan), H. Haupt te Halle, Dr. W. Trautmann te Lautawerk en Dr. L. Vuyck te Schalkhaar voor de door hen betoonde welwillendheid.

J. v. D. VECHT.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Kraanvogels in Juli in den Haag. — Hedenmiddag om 14 uur zagen wij 3 vogels over ons heen vliegen, wij bevonden ons op het dak der Eerste Kamer. Ons vermoeden was dat het Kraanvogels waren (*Megalornis g. grus*). Zij hadden een langen hals die zij recht vooruit gestoken hadden. De parelgrijze kleur van onderen en de sierveeren waren duidelijk te onderscheiden, daar zij op ± 20 meter boven ons vlogen. Wij vonden het zeer vreemd, dat zij 1^o. op een zeer zeldzame plek voorkwamen en 2^o. in een zeldzame tijd. Daarom vragen wij U of U ons in „De Levende Natuur” eenige opheldering wil geven.

Den Haag, 21 Juli 1928.

HERMAN VADER.
F. J. BOERMAN.

In Juli en Augustus kunnen we van haast elke vogelsoort allerlei afwijkingen van den geregelden gang van zaken verwachten. Zoowel jonge vogels als oude vogels, die niet gebroed hebben, vertoonen zich dan op ongewone plaatsen en tijden. Ik heb al eens meer gewezen op het belang van vogelwaarnemingen gedurende de groote vakantie. Misschien wordt uw waarneming door andere bevestigd. T.

De Posthoortjes. — Wij brachten de eerste helft van Augustus door te Gulpen, een zeer aangenaam en bruikbaar uitgangspunt voor wandelingen in Zuid-Limburg. Het wemelde er letterlijk van Posthoortjes of Luzerne vlinder en wel voornamelijk de Oranje soort *Colias edusa*. Wij zagen ze van den Ubagsberg tot Epen, van Noorbeek tot Vaals. In het heele gebied wordt luzerneklaver veel verbouwd en komt ook verwilderd voor. Intusschen leeft de rups ook wel op andere vlinderbloemen. Een andere immigrant, de Distelvlinder (*Pyrameis cardui*) kwam ook talrijk voor. De Engelsche tijdschriften maken eveneens melding van de groote talrijkheid van *Colias edusa* in dit jaar. T.

1) Typische exemplaren van deze soort waren reeds langer uit ons land bekend.