

## DE LEVENSMOMSTANDIGHEDEN VAN DEN ZEEHOND IN NEDERLAND. 191

duurt; dit in verband met den langzamen groei der tanden zonder welke het jong niet zelf aan den kost kan komen. Intusschen is deze laatste opgave, die men bij verschillende auteurs kan aantreffen, ook al weerlegd en tot de helft (12 maanden) gereduceerd (1, pp. 108/109, noot). Vervolging en achteruitgang van den Walrus zijn dezelfde als van de andere robben der Noordelijke IJszee. Duizenden en nogmaals duizenden (ALLEN vermeldt 10.000 à 12.000 per jaar) zijn bij Groenland en Spitsbergen gedood en de talrijke kudden van vroeger zijn de een na de ander verdwenen. Van de verwoestingen, die de Eskimo's tegenwoordig in Alaska aanrichten geeft BERNARD (10) eenig idee.

Behalve de traan en de huid, die goede drijfriemen levert, zijn nog de tanden van waarde. Zij kunnen tot 60 cm. lang worden en vormen een belangrijk handelsartikel voor de Tsjoecksjen, die aan de siberische kusten hun vaste woonplaatsen hebben en die deze tanden via hun nomadiseerende stamgenooten aan de Russen doen toekomen. Hoe een verwaalde Walrus in het beschaafde Europa wordt bejegend, kan men lezen in REDEKE'S berichtje (49).

(Wordt vervolgd).

G. A. BROUWER.

## VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

**Rectificatie.** — *Iets over Boletus parasiticus.* Door het niet tijdig kunnen corrigeren van de drukproef zijn er in dit artikel (blz. 74 van deze jaargang) nog enkele drukfouten blijven steken, te weten: bladz. 78, r. 17 v. o. staat: 1,5 tot 5,7 breed; lees 1,5 tot 5,7 *cm.* breed; volgende regel: *komma* achter kort; onderschrift fig. 5, r. 3 staat: *exentriek* maken, lees *exentrieke* mafen; blz. 79, r. 1 v. b. staat: *onregelmatig*, 12—16 bij 3—5 $\mu$ ; lees: *onregelmatig* spoelvormig, 16 bij 5 $\mu$ .

**Kikkers-enquête.** — *Bufo calamita*, de kleine pad komt voor tusschen Epen en Eperheide (Zd.-L.).

Hengelo, 1928.

G. KRUSEMAN.

*Bufo vulgaris*, gewone pad komt bij ons aan de Zaan *niet* voor zoover ik weet; wel veel *B. calamita*. — Reeds bij Assendelft is wel *B. vulgaris* gevonden.

Westzaan.

J. Vis.

De *Heikikker* komt voor bij Wijster (Dr.) en bij Zeijen (Dr.).

Groningen.

G. A. BROUWER.

Op het „*land van Vollenhove*” werden tijdens de excursie van de Ned. Bot. Veréén. (Juli 1928) genoteerd: Groene kikker en bruine kikker, gewone pad (*B. vulgaris*) en kleine pad (*B. calamita*).

J. Hs.

Na een maand op „de Beer”, Hoek van Holland, gekampeerd te hebben, wil ik u even meedelen wat we aan kikkers vonden. „De Beer” is uiterst arm aan die kwakende gedrochten; wel is waar letten we meer op de vogels; maar een kikker loop je toch niet gauwer voorbij dan een jonge kievit.

Kleine pad is op de Zuider Pier algemeen. Bruine kikker vonden we twee maal in „de Beer” zelf. — In de Witgatplas zaten troepen larven; we hadden geen tabellen bij ons; wat het waren weten we niet. Voor het grootste deel zullen ze wel door de vogels opgegeten zijn. Dit is alles.

Utrecht.

M. RUTTEN.

**Stratiotes-mannetjes.** — In het veen ten N.O. van het land van Vollenhove zagen we onder de bloeiende scheeren nog al veel mannelijke, zelfs meer dan vrouwelijke.

J. Hs.

**Zomerwaarneming van een Nonnetje.** — 29 Juni 1928 zagen M. Rutten en ik in de haven van Hoek van Holland een  $\sigma$  nonnetje (*Mergus albellus* L.). Van Oordt en Verweij vermelden drie zomerwaarnemingen, op zoet water, die mogelijk op aangeschoten vogels betrekking hebben. Aan deze vogel konden we op dat oogenblik niets bijzonders zien.

Den Haag.

N. TINBERGEN.