

Albino Kwikstaart. — In de afgelopen week (Woensdag 10 October j.l.) bezig zijnde met het ploegen van roggeland ontdekte ik tusschen een troepje Witte Kwikstaartjes (*Motacilla alba*) een „*neeuw wit*” exemplaar. Daar ik als eenvoudig boer over te weinig literatuur beschik, kan ik niet nagaan of van genoemde soort reeds *eerder albino's* zijn waargenomen. Van vergissing kan in dezen geen sprake zijn want ik had meer dan een uur gelegenheid het diertje waar te nemen. Alle bewegingen, zooals het wippen met den staart, het vliegen in zigzaglijn en ook het stemgeluid beantwoorde volkomen aan een kwikstaart. Het bewuste exemplaar had volkomen de „natuurlijke grootte” en voorzoover ik zien kon en dat was dikwijls op 2 M afstand *geen enkel zwart veertje en roode pooten*. Het beestje was zoo in het ooglopend, dat het ook anderen niet-vogel-liefhebbers direct opviel.

Aalten, Lintelo 47.

C. J. DOORNINK.

Aschgrauwe Kiekendief. — Midden Juni van dit jaar vond een der Red-Brothers, na eindeloos zoeken een nest met vijf jonge aschgrauwe Kiekendieven in de duinen. Het is beter de juiste vindplaats te verzwijgen; alleen mag ik wel vertellen, dat het in de duinen was ten zuiden van het Noordzee-kanaal en ten Noorden van de Wassenaarsche slag. Dat de soort daar ter plaatse broedde, wisten we al jaren en heel wat dagen heeft dat roof-

vogelpaar ons bezig gehouden. Elk jaar weer opnieuw deden we pogingen hun nest te vinden, maar altijd weer tevergeefs. Er waren dagen, dat we zelfs geen aschgrauwe zagen en wat of we ook probeerden, de vogels waren ons te slim af. Het terrein is zeer uitgestrekt en omdat we de vogels nu eens in het Noorden zagen jagen, dan weer in de buurt van het „Barre Zuiden” het „Zuid-poolbekken” zoo gaarne betitelden en overal met goede en geschikte nestgelegenheden bleef het zoo voor den voet zoeken eigenlijk een onbegonnen werk. Geen enkele maal in al die voorjaren na het Trekstation Noordwijk aan Zee hadden we het geluk de broedende vogel op te stooten. Dit jaar bleek ook wel dat het broedend ♀ zeer vast zat, want toen het nest gevonden werd, ging de vogel pas op toen de gelukkige vinder bijna op de vogel trapte. Het nest lag in een duindal in een zeer dichte en uitgestrekte liguster-wildernis. Een der jongen bleek op een dag spoorloos verdwenen te zijn, maar de andere vier groeiden voorspoedig op. We hebben ze geringd en gefotografeerd, midden Juli zijn ze uitgevlogen.

Op denzelfden dag dat dit pygargus-nest gevonden werd, vond Frans Kooijmans uit den Haag nog een tweetal nesten van deze soort, één uur gaans van het Red-Brother nest. Het eene bevatte vier eieren en het andere, hetwelk nauwelijks 100 M. verder lag, vier jongen. Jammer genoeg werden



Jonge aschgrauwe kiekendief bijna vliegvlug.
11 Juli 1928. Foto J. STRUBOS.

de eieren geroofd, maar de vier jongen zijn naar alle waarschijnlijkheid goed uitgevlogen. In Juni werd ook nog een nest gevonden in de duinen tusschen Noordzee-kanaal en Egmond. Ik heb alle hoop, dat ook deze jongen goed terecht zijn gekomen.

Bentveld, Aug. '28.

JAN P. STRUBOS.