

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Een vraag. — Mag ik u even lastig vallen met onderstaande vraag:

In December wandelde ik in een dennenbosch in sneeuw. In den steilen zijkant van het voetpad was een dier begonnen met een hol, althans een gat, te graven, dat echter niet doorliep, doch slechts een halve meter diep was. Ik dacht dat dit een konijnehol zou zijn (de doorsnede van het gat was die van een konijnehol), doch begon te twifelen toen ik op het uitgeworpen zand, dat nog tegen de helling rondom de opening van het hol lag, talrijke uitwerpselen vond, die van geheel anderen vorm waren dan de bekende van het konijn. Zij hadden den vorm en afmeting van dikke rupsen, zagen aan de buitenzijde grijsgroen, terwijl zij zonder uitzondering bleken te bestaan uit bruinglimmende schilfertjes van zaadjes of dergelijke plantendeelen.

Kunt u mij misschien in uw rubriek Vragen enz. inlichten?

Utrecht, 24 December 1928.

S. VAN RAVENSTEYN.

Een eigenaardig gekleurde mol. — Begin Januari ontving ik uit het Westland een mol, die bijna geheel zeer licht zilvergrijs was. Slechts aan de buikzijde liep van staart tot kop een oranje streep, terwijl ook de zijkanen van de kop oranje kleurig waren. G. B.

Maaginhoud van steenuil, 21 Nov. 1928. — Het was mij bekend, dat de steenuil zijn dieet sterk wijzigt naar gelang van het jaargetijde, maar ik was toch eenigszins verbaasd er behalve een rups van *Agrotis pronuba* ook een groote volwassen veenmol (*Gryllotalpa vulgaris*) in de maag aan te treffen. Het beest was in zijn geheel doorgeslikt, slechts het voorborststuk was ingedrukt. G. B.

Zeearenden. — Nadat zich in Januari op de Veluwe reeds een zeearend had vertoond, die echter helaas op de Kon. Domeinen onder Gortel geschoten is, bracht de heftige koude van midden Februari op de Neder-Veluwe (tusschen Otterlo, Arnhem, Hoenderlo) wederom een tweetal dezer vogels. Wij kunnen slechts hopen, dat ook niet deze aan kruit en lood ten offer zullen vallen; het terrein, waar zij zich tot nu-toe bij voorkeur ophouden, biedt, dank zij den humanen eigenaar, gelukkig waarborgen genoeg voor een veilige hibernage.

Wageningen.

A. B. WIGMAN.

Het opvliegen van vleermuizen. — Verder had ik een opmerking omtrent het van den grond opvliegen van vleermuizen, waarover u sprak in De Levende Natuur December-nummer naar aanleiding van Dierkunde Dr. v. Pesch. Een 20 jaar geleden heb ik eind Juli een vleermuis gevangen „grootoor” met een jong. Het diertje was zeer moe en kwam 's avonds tegen tien in mijn priëel achter huis terecht. Het jong hechtte zich sterk aan de moeder. Ik plaatste na plm. een half uur, toen het vrij donker was, het dier in den tuin op een omgespit akkertje zandgrond. Na eenigen tijd vloog de vleermuis plotseling op; van zich laten vallen of iets dergelijks geen sprake. Voorzoover ik nog kon nagaan gewoon van den grond opvliegen en dat nog wel met een vrij groot jong. Verhevenheden waren aanwezig hoogstens van 1 cM. Sindsdien heb ik bovenstaande ettelijke keeren bij mijn lessen van opleidingscursussen enz. meegedeeld, maar steeds leest men weer, dat vleermuizen niet van den grond kunnen opvliegen. Ik deel dus dit even mee ter nadere bevestiging van uwe opmerking.

M. KRAMER.

De Klecho. — Onze lezers herinneren zich, dat wij in een van onze vorige jaargangen een artikeltje gaven over het kleinste vogelnest ter wereld, dat van de Klecho. Thans geeft de heer H. van Meurs in het Orgaan der Club van Nederlandsche Vogelkundigen een prachtige studie over dit buitengewoon merkwaardig vogeltje, *Hemiprocne longipennis*, een verwant aan de Salanganen, die de eetbare vogelnestjes bouwen. Wie zoo'n salanganen-nest wel eens goed bezien heeft moet wel getroffen zijn, door de fraaie gebogen lijnen, die het omgrenzen. Ook het nest van de Klecho heeft zoo'n fraaie vorm die, zooals de

heer Van Meurs op wiskundige gronden aantoon, zijn vastheid ontleent aan de insgelijks zeer bepaalde bouwmethoden. Ook betoogt hij dat het nest zoo klein moet zijn, omdat het open en bloot boven op den boomtak ligt en dus door den vogel in zijn geheel tegen den regen beschermd moet kunnen worden. Ook in nog veel andere opzichten is deze studie zeer belangrijk en een goede aansporing voor ieder nestenzoeker, om bij het aanschouwen van een nest nog eens aan wat meer te denken dan aan de bouwmaterialen alleen. T.

Het bezoek aan De Beer. — Tot ons groot genoeg kunnen wij mededeelen dat voor het volgende jaar het bezoek aan De Beer (Rozenburg) zoo geregeld zal worden dat het natuurmonument niet meer te lijden zal hebben, noch door overtalrijkheid van het bezoek, noch door achteloosheid of misdraging der bezoekers. Men beseffe toch dat De Beer een natuurmonument is van gelijken rang met het Naardermeer, met Griend of met de Muy op Texel. T.

GEVRAAGD:

Broek (v. d.), Ontwikkelingsgeschiedenis van den Mensch; Detmer (W.), Das kleine pflanzenphysiologisch praktikum, 4e dr. 1912; Goor (Dr. v.), Het afstammingsvraagstuk en verhouding tot geloof en wijsbegeerte 1919; Hussack, Katechismus der Mineralogie; Moll, Handboek der Plantbeschrijving, 3e druk 1922; Sipkes, Flora van gekweekte kruidachtige gewassen; Thijsse, Het vogeljaar, 3e druk 1923; Walter, Vorschule der Geologie.

Opgaaf van prijs en staat aan H. HOOGENDOORN, Roode Zand 272, Oudewater.

AANGEBOODEN:

Tigerstedt, Lehrbuch der Physiol. des Menschen, 2 dln., geb., plm. 1000 blz. f 3.—; Verslagen Ned. Ent. vereen. 1918/1927, 20 stuks in een band gebonden f 5.—; Album der Natuur, 1906, geb. f 1.—; Hemel en Dampkring, 1927, (afl.) f 3.50. — Porto v. kooper. Antwoord binnen 4 dagen.

Adres: H. HOOGENDOORN, Roode Zand 272, Oudewater.

De Levende Natuur, jaargang 32, in losse afleveringen. — Porto voor kooper.

A. TICHELAAR, Noorder Parallelweg 30, Velp (G.).

Als zijnde overcompleet, de volgende lantaarnplaatjes — goed gemonteerd, formaat $8,3 \times 8,3$ cm. — naar eigen foto's van in 't wild levende vogels op of bij 't nest e.a.: groote mantelmeeuw, groote alk, scholekster (2), wulp, vischdiefje (4), kievit (2), tureluur (3), dwergstern, zilvermeeuw, tapuit, merel, grauwe klauwier, winterkoning, oeverlooper, pimpelmees, kwartel, groote sterns (extase houding) (2), kwartelkoning, kokmeeuw (in aanvalshouding), strandpluvier, zwarte stern (jongen), rietgors, totaal 30.

Adres: J. VIJVERBERG, Noordgauwe.

Peters u.s.w., Chemische Experimente, 1903, geb. f 0.50; Bardeleben, Anatomie des Menschen, 5 deeltjes, geb., nieuw, samen f 1.50; Leche, Der Mensch 1922, ingen., nieuw, f 1.75; Steiner, Erforschung Lebewelt Gewässer, 1919, ingen., nieuw, f 0.50; Leisz, Untersuchungen kristall. Körper, 1914, ingen., nieuw, f 0.50; Donau, Arbeitsmethoden, Mikrochemie, 1913, ingen., nieuw, f 0.50; Kaiserling, Die mikrophotographischen Apparate, 1918, ingen., nieuw, f 0.50; Francé, Das Leben der Pflanzen, prachtwerk, 8 zware dl., halfleer, 1913/'21, nieuw, f 21.—; Heukels, De Flora van Nederland, 3 deelen, halfleer, f 11.—. Porto voor koopers. Binnen 5 dagen geen bericht, niet meer verkrijgbaar. Postr. nr. 18774.

Adres: H. VAN REE, Aardswoud (N.-H.).