

**De Graafwespen van Nederland. Verbeteringen.**

I. In de Groepentabel van *Gorytes* (L. N. XXXII, pag. 52) leze men:

1a. Voorpooten ♀ *zonder* tarsenkam. 1b. Voorpooten ♀ met tarsenkam. De Heer J. Koornneef wees mij op deze storende drukfout.

II. Volgens mededeelingen van Dr. *Betrem* moeten overeenkomstig de nieuwe nomenclatuurregels in de namen der rupsdooders de volgende wijzigingen aangebracht worden:

a. het geslacht *Ammophila* (L. N. XXXII, pag. 112) moet *Sphex* heeten.

b. het geslacht *Psammophila* (idem pag. 13) wordt *Podalonia Spinola* gedoopt.

c. de *ruige* rupsdooder mag de soortnaam *hirsuta Scop.* niet langer dragen, maar moet heeten *Podalonia viatica L.*, zulks in verband met het volgende.

III. Volgens H. Haupt, Monographie der *Psammocharidae* (*Pompilidae*), 1927, pag. 308) draagt de gewone wegvesp, *Pompilus viaticus L.*, dezen naam ten onrechte. Linnaeus heeft met zijn *Sphex viaticus* niet de gewone wegvesp, maar juist de ruige rupsdooder bedoeld.

Onze spinnendooder krijgt dus den naam *Pompilus (Anoplius) fuscus L.*

Bilthoven.

B. E. BOUWMAN.

**De paarse schelpzwam.** Naar aanleiding van mijn stukje (L. N. XXXIII, pag. 231) deelde Mevr. de Visser-Roelofs te Bloemendaal mij het volgende mede. „Ik vond in Sept. '27 een exemplaar aan een *eikenstronk* te Aerdenhout. Mej. Cool bracht het nu naar 't Rijksherbarium waar het geconserveerd werd naar ik meen.” Met vriendelijken dank aan de medewerkers, houden wij ons ten zeerste voor verdere mededeelingen aanbevolen.

B. E. BOUWMAN.


**De Addertong (*Ophioglossum vulgatum*) in Friesland.** — De addertong, een sporeplant, die haar sporen vormt in een bladdeel, dat in een vruchtaar is veranderd, was tot nu toe

wel op de Friese eilanden, doch niet op het vasteland van Friesland aangetroffen. Gevolg gevende aan de oproep in de Decemberaflevering van D.L.N. vermelden we hier de vondst van de addertong in de Warren, het eens zo moerassige terrein ten zuiden van Hardegarijp, een gebied, waar vroeger ook orchideeën, zoals *Orchis Morio* en *O. incarnata* algemeen voorkwamen, doch dat tans door drainering en bemesting in goed grasland is veranderd.

De eer van de vondst van de addertong komt toe aan een H.B.S.-scholier, een zekere Hotse. Maar wie is Hotse? Hij was een van de leerlingen van de heer J. Jensma, te Leeuwarden, die met hen een excursie naar dit gebied maakte. De heer J. P. Wiersma, die toevallig de bezoekers daar ontmoette, kreeg van deze vonds kennis, en bij latere gelegenheid toen we op 23 Mei 1927 met de heer Wiersma dit gebied bezochten, wees hij ons de vindplaats in het zuidelijk deel der Warren (H 6, 53, 33).

Een kennis, de heer van Willigenburg, beeldde één der eksemplaren af en daar wij voor het vasteland dezer provincie geen vindplaatsen vinden opgegeven vermelden wij deze vondst in dit tijdschrift, temeer daar dan misschien andere lezers van nieuwe, hun bekende vindplaatsen opgave doen.

K. F. en K.



Een addertong.

Leeuwarden.

**Cornus suecica en *Trientalis europaea*.** — In de aflevering van Maart van dit tijdschrift komt voor een opgave van groeiplaatsen der genoemde planten, gegeven door de heer Dr. W. Beyerinck. Hierbij zijn, wat de provincie Groningen betreft, een paar onjuistheden ingeslopen. *Cornus* komt n.l. niet bij Winschoten voor, zooals verkeerdelijk ver-