

waarnemen en met een eenvoudigen kijker zelfs best. — Den 7den Aug. zag ik één exemplaar aan den ouden Arnhemschen weg; die dieren verspreiden zich dus ook wel, en blijven niet in vluchten bij elkaar.

Mijn dochttertje, die me vergezelde, sprak bij voorkeur van dennepapegaaien.

Nu ik toch schrijft, kan ik ook even melding maken van het groote aantal koolmeezen dezen zomer. Ze komen bij ons aan de tuindeur, soms tien te gelijk, de gepelde pinda's uit de hand eten, zeker ook al, nu door het regenachtige weer minder insecten te krijgen zijn. Sommige komen daartoe de kamer binnenvliegen. Ook het aantal vliegenvangers, roodborstjes, roodstaartjes en vinken is buitengewoon groot. Daarentegen zie ik weinig of geen van de andere meezensoorten, als b.v. de staartmees, die twee jaar geleden, bijzonder talrijk was.

Om van de vogels af te stappen: Ook een eekhoorn komt aan de deur zijn pinda's halen en 's avonds om half tien een egel zijn schoteltje melk

De bosschen staan vol paddestoelen; zeer talrijk is de eetbare Cantharelle. Ook vonden we een heel mooi koraalzwammetje. De plantengroei langs den spoorweg tusschen Maarn en Maarsbergen is schitterend. Blauwe klokjesgentianen, wammesknoopen, Scabiosa, Knautia, Hypericum (in twee soorten), wederik enz. enz. Voor een natuurhistoricus is, in weerwil van het regenachtige weer, toch nog veel te genieten.

Doorn, 8 Aug. '30.

L. DE VRIES.

Kruisbekken. — Thuis gekomen van mijn vakantie vond ik in aflevering 4 al mededeelingen over de kruisbekken. Na den laatsten datum in mijn vorig schrijven genoemd, zag ik ze nog alle dagen, eens op een wandeling van Doorn naar Driebergen langs den Ouden Arnhemschen Bovenweg in groot getal. Wat de samenstelling betreft, viel het mij op, dat er betrekkelijk weinig mannetjes bij waren en veel jongen. Wat het geluid aangaat, mijn dochttertje, die uw beschrijving had gelezen, haalde de messenleggers en rammelde ze door elkaar en we vonden dat u het geluid goed heeft weergegeven.

Harmoniehof 36m, Amsterdam.

L. DE VRIES.

Allerheiligenheide. — Den 27en October j.l. deden de Heer J. A. van Steyn, Inspecteur van het Staatsboschbeheer te Utrecht en ondergeteekende een inspectietoeltocht over de Eenerheide, onder de gemeente Norg, toen wij op de Eenerschans, eigendom van de „Stichting Oud Drenthe”, een donkergroene pol heide aantroffen, die volop bloeide.

Ik zond een takje aan Dr. Beijerinck te Wijster die mij als volgt bericht:

„Je vondst is schitterend! Het is de z.g. Allerheiligenheide (*Calluna vulgaris*, f. *Omnium sanctorum* Joh. Jansen). Deze vorm is ontdekt en beschreven door een naamgenoot, n.l. den Heer Joh. Jansen te Malden (G.) bij Mook, en wel in 1926. Nadien schijnt zij nooit ergens anders in ons land te zijn aangetroffen; ook niet door onze floristen. In de „literatuur is deze var., voor zoover mij bekend, nergens anders beschreven dan in De „Levende Natuur, Jrg. 31, pag. 370—373 en Jrg. 33, pag. 140—143. Beide stukken zijn van den Heer Joh. Jansen.

„Door deze vondst staan de vorige, in het gebied ten Z. van Nijmegen, niet meer op „zich zelf”.

De Houtvester bij het Staatsboschbeheer:
J. J. M. JANSEN.

Hoog- of laagveen. — In 1929 werd door het onderzoek van Mej. Dr. B. Polak uitgemaakt, dat, wat op de kaart in het Westen des lands als laagveen stond aangegeven, ontstaan uit riet en biesen voornamelijk, in werkelijkheid hoogveen was en voor het grootste gedeelte was samengesteld uit veenmos. Dat de hoogveenvegetatie bij de Liede, waar in 1910 Prof. Dubois al de aandacht op vestigde, dus geen laagveen was, waar toevallig hoogveenvegetatie op groeide.

Zoo staat ook op de kaart aangegeven, dat het veen bij de Beulakker en Belterwijde laagveen is. Ook hier groeit langs de Schutsloot op het land van den eigenaar Klaver bij elkaar: veenmos, een soort varen, braam, zonnedaauw en dopheide. In den winter gaan de bewoners van de Schutsloot „stobben trekken”, d.w.z. ze halen boomstammen, die onder het veen in het zand liggen, te voorschijn om voor brandhout te dienen. Dit nu is