

Eén van de vijf was volwassen, zijn vleugels waren van boven geheel blauw met het witte randje er achter, van onderen geheel zwart met witten rand. De kop was niet geheel zwart. De andere vier hadden alle nog bruine vlekken op den bovenkant en lichte vlekken op den onderkant van de vleugels. Ze waren erg mak en ik had spijt, dat ik mijn kamera niet bij me had.

3 September kwam ik er weer. 't Was nu rustig met landwind. Nu waren er 18, waaronder 3 jongen van dit jaar, die nog niet hun eerste winterkleed droegen, maar nog veel donkerbruin op de schouders hadden. Twee anderen waren zelfs op 50 meter, met een 8 x 30 kijker en volle zon in den rug, niet van vogels in prachtkleed te onderscheiden, hun kop was geheel donker en de borst rose aangelopen. Ze vingden, in gezelschap van kok- en stormmeeuwen, insekten in de vlucht, en streken van tijd tot tijd op het water. Uit het feit, dat er drie jongen van dezen zomer bij waren, blijkt, dat althans een deel der vogels vroeger trekkers waren; de ruim éénjarige vogels kunnen ook overzomerd hebben, zooals Dr. ten Kate bij 't Kampereiland waarnam.

N. TINBERGEN

**Morinelplevieren.** Op 30 Augustus zagen we op 't Groene Strand op den Hoek van Holland weer 15 Morinelplevieren. Dat is nu al het vierde najaar, dat ze tusschen 20 Aug. en 15 September op den Hoek zijn. Ze waren niet zoo mak als 't vorig jaar en twee jaar geleden.

N. TINBERGEN

**„Zeekreeft” in de Berkel.** Eibergen, 7 October. Als een bijzonderheid mag zeker wel vermeld worden, dat dezer dagen door J. Kruidenier in de Berkel bij de Mallemse molen een „zeekreeft” werd gevangen. Vanzelfsprekend trok zulk een zeldzaamheid veel bekijks.

Werkelijk verschalkte de visscher in zijn net een kreeft, maar een, die van oudsher in de Berkel thuis hoort en volgens Dr. O. Schmeil's „Leerboek der Dierkunde” thans *nagenoeg verdwenen is*, en in onze stroompjes en in de Duitsche. 't Was n.l. een mooi exemplaar van de rivierkreeft (*Astacus fluviatilis*) ± 15 cm. lang en bruin van kleur. Onze Berkel huisvest dus gelukkig nog zoetwaterkreeften, maar veel zijn 't er niet, want, hoewel reeds twintig jaar visscher, was dit de eerste maal, dat de betrokkene een kreeft in zijn net ving.

Eibergen 9-10-31.

G. C. FIECKEN

**Europeesche Treksprinkhaan.** Bij het aardappelrooien werd op een akker hier ter plaatse een ex. van de Europeesche Treksprinkhaan (*Pachytylus migratorius* L.) gevonden.

Toen ik het dier om het voor conserveering te dooden een injectie met ammonia (10 %) gaf, wierp het de linker achterpoot af; de breuk kwam tusschen trochanter en dij; terwijl het tevens een groote druppel donkergroen bloed uitperste. Bij naslaan in Brehm vond ik in Dl. II op pag. 85 het voorkomen van autotomie bij sprinkhanen vermeld.

Oude Pekela, 16 Sept. 1931.

J. MART. DUIVEN

**GEVRAAGD:** „Hymenoptera Aculeata of the British Islands” door E. Saunders, editie met gekleurde platen.

Aanbieding met vermelding van staat en prijs aan P. VERHOEFF, F. C. Dondersstr. 36bis te Utrecht.

**AANGEBODEN:**

Te koop voor den meestbiedende: De Nederlandsche Insecten door Dr. J. Th. Oudemans en Die Hymenopteren Mitteleuropas von Prof. Dr. O. Schmiedeknecht, 1e Aufl. 1907; beide werken zijn in zeer goeden staat.

Te bevragen bij P. M. F. VERHOEFF, F. C. Dondersstr. 36 bis te Utrecht.

Karl Neunzig, die Vögel der Erde f 0.75; W. H. Divers: Spring Flowers at Pelvoir Castle f 0.50; Karl. Ewald: Mutter Natur erzählt f 0.50; Dr. P. G. Beukers: De Ontwik. gesch. der Lev. Nat. pop. overzicht der theorieën f 2.—.

Port wordt extra berekend na een week geen antwoord, dan verk. bij: F. W. ESTOPPEIJ, Dorpstraat 105, Amstelveen.

Tigerstedt, Lehrb. d. Physiol. d. Menschen, 2 Bde. geb. f 2.50; Bock, Dr. C. H. Het menschel. lichaam. geb. f 0.50; Specht-Naumann. Die Vögel Europas, Bd. I, afl. 1, 2 en 3 à f 1.—; M. Douin, Nouv. Flore des mousses et des hépatiques, f 1.50; A. Boistel. Nouv. Flore des lichens, f 1.25; Dr. G. Lindau. Kryptogamenflora für Anfänger, Bd. 2, I: Mikr. Pilze. 2e Aufl. f 2.10.

Adres: C. ROELEVELD, Polsbroek (U.).