

Deze veronderstelling is misschien onjuist, doch het geheele geval heeft mij zoo gefrappeerd, dat ik besloot U te verzoeken bovenstaande in uw blad te willen opnemen.

Doorn, 29 Mei '31

H. C. ALTENA

Walvischenvangst. Misschien interesseert U zich voor een vondst, die hier op het Texelsche strand onlangs is gedaan.

Op 3 Oct. j.l. is bij paal 11 het cadaver aangespoeld van een Cetacee, waarvan ik een tand en een korte beschrijving opzond aan Dr. Van Deinse.

Het bleek een spitsnuitdolfijn te zijn (*Delphinus delphis*), dus een zeldzame vondst, het 5de exemplaar van deze soort, dat op de Nederlandsche kust is aangespoeld.

Het dier heb ik op verzoek van Prof. v. Oort naar Leiden laten opzenden. Daar wachtte de Cetacea-kenners een verrassing: het bleek n.l. een wijfje te zijn, dat 2 bijna voldragen embryo's inhield, die voor conserveering nog uitstekend geschikt waren.

De lengte van deze dolfijn was 2.20 m.; hij is dus nogal wat langer dan een bruinvisch en heel wat kleiner dan een gemiddelde tuimelaar.

De lezers zullen zich herinneren, dat indertijd in De Levende Natuur een beschrijving heeft gestaan van de in de Slufter aangespoelde Witsnuitdolfijn (Oct. 1929).

Texel, 21 Oct. 1931

H. J. A. KRAAI



Drijfzand op Terschelling.

Drijfzand. Er ging vroeger een verhaal op Terschelling, dat wel eens een kar met twee paarden, die in volle vaart over de zandplaat joeg, door het drijfzand is verzwolgen. Daar moest ik aan denken, toen wij in den voorzomer van dit jaar op de Boschplaat terecht kwamen bij een groote glimmende plek drijfzand, wel veertig meter lang en half zoo breed. Aan den kant zat je er gauw tot over de enkels in en een wandelstok, erin gestoken, ontmoette haast geen weerstand. Inderdaad zou hier een onbedachtzaam harddraver wel eens slecht terecht kunnen komen. Echt drijfzand heeft altijd een glimmend oppervlak. Maak u echter niet ongerust over „den dood in het drijfzand”.

T.

Kapmeeuw. In den middag van den 1sten Nov. '31 werd mij een kapmeeuw gebracht, welke gevonden was in de Amsterdamsche Waterleidingduinen onder Aerdenhout. Het was een jong dier, geboren in 1931, had een gebroken vleugel en droeg een voetring met het inschrift „Lotos” Liboch a.E. Bohemia S. 1419. Daar de meeuw er slecht aan toe was bracht ik haar nog dienzelfden dag naar Artis, waar de heer Portielje

de gebroken vleugel bij het schoudergewricht amputeerde. Het mocht echter niet meer baten, een paar dagen daarna stierf de vermagerde en reeds sterk verzwakte kapmeeuw.

Van het Ornithologische Station „Lotos” ontving ik bericht, dat de meeuw door den leider van dit particuliere ringstation Ir. Kurt Loos, op 28 Mei '31 als nestjong geringd werd nabij Hirnsener Teich (Noord-Bohemen). Cecho-Slowakye.

JAN P. STRIJBOS

Trek in de mist. 14 Nov. j.l. 's morgens tusschen 6 en 7 uur, viel het me op, hoe niettegenstaande de mist aanhoudend de heldere roep van trekkende scholeksters en wulpen(?) te hooren was boven mijn woning, Overtoom bij Schutsluis. Het leek me zeer laat in het jaar (mij als leek).

Amsterdam

Mej. C. MULDER

Roofvogelwaarnemingen in den zomer van 1931. A. r o n d B r e d a. *Strijbeekse Hei* vegetatie: uitgestrekt vlak heiterrein, hier en daar begroeid met oude lage dennen, meestal echter met jonge dennen, in het terrein liggen veel vennen en vennetjes (deze zijn meestal dichtgegroeid). Over 't algemeen vrij moerassig vooral in dezen tijd, overigens een ideaal terrein voor wilde Eenden (31 Aug. $\pm$ 300 uitsluitend ♀♀). Enkele stukken van de hei zijn ontgonnen, meest tot grasland. 27 Aug. Bruine Kiekendief, ♂ juv., jagend boven de vennen. Boomvalk. 29 Aug. 2 Torenvalken wiekelend (zeer waarschijnlijk broedvogels). 31 Aug. Ruigpootbuijzerd (zwarte polsvlekken op lichten onderkant der vleugels en witte staart met breeden donkeren eindband). We werden erop attent gemaakt, doordat Kraaien den Ruigpoot achterna zaten, onder hun karakteristieke roep. 31 Aug. werd hij door $\pm$ 10 Kraaien bestookt, waarvan slechts één de vervolging

volhield. 29 Aug. Sperwer, achterna gezeten door veel Zwaluwen, maar hij kringde rustig verder.

Vruggelsche Hei. vegetatie: uitgestrekt heiterrein, bijna overal begroeid met dennetjes en dennen, waaronder slechts enkele hoge oude boomen. Dan zijn er zg. „kopjes” (door ons zoo genoemd), heuvels nl. vanwaaruit men een aardig uitzicht heeft over een gedeelte van de hei. Aan den rand van de hei bouw- en grasland. 't Heele jaar door 2 Torenvalken. 2-30 Mei: Boomvalk, jagend. 30 Mei—17 Juli: Grauwe Kiekendief (♂ en ♀) laag boven de dennen schommelend, ♀ hoog boven 't ♂ vliegend. 30 Mei: Sperwer, heftig bestookt door een Kraai.

Vughtpolder. vegetatie: uitgestrekte graslanden (met enkele boomen) achteraan in 't najaar en den winter vrij drassig (winter 1930-'31 $\pm$ 1200 Grauwe Ganzen); 't heele jaar door 2 Torenvalken. 11 April: Sperwer, zeer hoog; trekrichting N.W.

Setersche Bosschen. vegetatie: hoofdzakelijk dennenbosch, op sommige plaatsen loofhout als onderhout, aan den eenen kant van 't bosch grasland, aan den anderen zandverstuivingen, grootendeels met jonge dennen begroeid. 23 Mei: 2 Torenvalken, boven een gerooid stuk bosch wiekelend; 2 Boomvalken, jagend.

St. Annabosch en Nieuw Bosch. vegetatie: uitsluitend hoge oude dennen, één groote jonge dennenaanplant, aan den rand van deze bosschen heidevelden, grootendeels ontgonnen tot grasland met enkele alleenstaande groepen dennen. 24 Mei—30 Aug. Boomvalk (gezien 2 oude ex. met 3 jongen door de heeren Klerk de Reus en Fabius). Behalve de bekende roep „gigigigi” hebben we ook nog een andere gehoord, iets als „kieuww”. In „The Birds of the British Isles and their eggs” van T. A. Coward staat een dergelijke roep nl. „quir-ic”. 25 Mei—24 Aug. Buizerd, deze werd bijna altijd zeer hoog zwevend en kringend boven 't bosch gezien. 14 Juli—29 Aug. Sperwer, meestal op vrij groote hoogte vliegend. 24 Mei—20 Juni: 2 Torenvalken, alleen overvliegend, waarschijnlijk afkomstig uit de buurt van Eikberg.

Geldersche Hei. vegetatie: vrij groot heiterrein, een beetje heuvelachtig, aan den eenen kant dennenbosschen (Mastbosch), aan den anderen grasland; op de hei enkele groepjes dennen. 7 April en 27 Aug.: Sperwer, die van 7 April hoog kringend N.W. 29 Maart—23 Mei: Torenvalk, meestal boven de hei wiekelend.

Wagenberg (Binnen-Polder). vegetatie: zie Vughtpolder, alleen veel moerassiger, in 't midden 2 Eendenkooien. 8 April: ♀ Torenvalk, wiekelend.

Tusschen Wouwen en Bergen op Zoom. vegetatie: onbebouwd open terrein, waarschijnlijk pas ontgonnen, aan den rand hoge dennenbosschen. 20 Aug.: Boomvalk.

B. op de Veluwe. 2 Aug. Otterloo. vegetatie: dennenbosschen, afgewisseld door zandverstuivingen (landgoed de Hooze Veluwe), jonge berkenaanplant op heuvelachtig terrein begroeid met helm en vliegdennen. Verder ook bouw- en grasland. Sperwer boven de dennen vliegend.

4 Aug. *Dassenberg.* vegetatie: dennenbosschen wat loofboomen omsluitend, aan den rand hiervan een uitgestrekt eenigszins heuvelachtig terrein begroeid met hei. Boomvalk boven 't dennenbosch vliegend.

6 Aug. *Assel.* vegetatie: eikenhakhout, een groote boerderij omsluitend, aan den eenen kant ingesloten door de hei (zie vegetatie Dassenberg), aan den andere eveneens door hei met verspreid liggende groepen dennen; enkele Torenvalken boven de hei wiekelend. Sperwer, dwars door een $\pm$ 20 Zwaluwen vliegend.

11 Aug. *Harskamper- en Kootwijker Hei.* vegetatie: uitgestrekt heuvelachtig heiterrein, bij Radio Station Kootwijk een lager gedeelte begroeid met hei de Gerrit Flesch insluitend, aan den voet van de hei zandverstuivingen hier en daar begroeid met dennen en wakels; enkele wiekelende Torenvalken. Sperwer boven 't stuifsterrein vliegend, nadat hij eerst uit een dennenbosch was opgejaagd. 2 ♂♂ en 1 ♀ Grauwe Kiekendief juv. waarvan een ♂ vlak boven den grond schommelend naar voedsel zocht. Zag hij iets, dan werd er geremd door de vleugels omhoog te slaan, plotseling den staart uit te spreiden en een eindje naar beneden te duwen à la Torenvalk. Boomvalk, deze kwam uit de richting Dassenberg en even later stootte hij herhaaldelijk op 't zooveen genoemde ♂ en ♀ van Grauwe Kiekendief, bij wijze van spelen waarschijnlijk, want even boven den Kiekendief zwenkte hij naar boven af en begon opnieuw 't stooten. Naderhand werden de rollen omgedraaid en stootte de Kiekendief op den Boomvalk, waarbij 't ook niet tot een treffen kwam.

15 Aug. *Deelen.* vegetatie: links van den weg Apeldoorn-Hoenderloo-Arnhem de Deelensche Hei, vlak heiterrein met aan den rand dennenbosschen, rechts van den weg uitgestrekt stuifsterrein begroeid met helm en hei, aan den rand hiervan dennenbosschen; aan den weg een groep alleenstaande dennen. Boomvalken, ♂ roepend en met prooi, 't ♀ neemt dit over en geeft 't aan de twee jongen. 't Overgeven van een prooi geschiedt op deze wijze: 't ♀ of de jongen draaien zich, wanneer ze vlak onder de vogel, die de prooi heeft, vliegen, in de vlucht om hun lengte-as om en nemen dan de prooi over in- en uit de uitgestrekte klauwen.

HERMAN LUDWIG en JOHAN BIJL
leerl. R.H.B.S. te Breda