

Bij nauwkeurige lezing blijkt m.i., dat de „eenzijdigheid” van het rapport van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten alleen daarin zou kunnen bestaan, dat van *één bepaalde zijde* op een *onderzoek* is aangedrongen. Voor die vraag is geen „veelzijdigheid” noodig, wel voor haar beantwoording! Dit laatste is trouwens in het rapport zelf duidelijk betoogd (blz. 21).

Het is niet mijn bedoeling over dit onderwerp hier verder in discussie te treden, doch ter voorkoming van eenzijdigheid in dit zoo belangrijke vraagstuk heb ik gemeend op het bovenstaande de aandacht te moeten vestigen.

Er is hier een ruim arbeidsveld voor de nieuw gevormde Commissie inzake de Drinkwatervoorziening van het Westen des Lands.

v. S.

Vertakte Roggeaar. Bijgesloten heb ik het genoegen U te doen toekomen een foto van een z.g. „Moederaar” (zooals deze in onze streek genoemd wordt), welke ca. een maand geleden tusschen de roggearen gevonden is. Zulk een aar komt slechts zeer zelden voor en wellicht is het wel nuttig om deze foto te plaatsen in „De Levende Natuur” en ze aldus onder de oogen van Uw geachte lezers te brengen.

Dieren, 28 Sept. '31.

W. VAN SCHELLEN.



Vroege en late legsels in 1931. Op 9 Mei vond ik in de Berger duinen reeds een nest met drie eieren van de Kleine Zeemeeuw. Er waren daar ter plaatse 14 paren, een echte kolonie vormend. Sedert 1912 toen voor de eerste maal het broeden van deze soort geconstateerd werd (en wel op Schouwen en op Rottum) is de kleine zeemeeuw als broedvogel hier te lande sterk vooruit gegaan. Thans nestelen ze geregeld op Texel, op de „Beer”, Schouwen, bij het Zwanewater en in de Berger- en Schoorlerduinen. In de beide laatste localiteiten eenige tientallen paren. De laatste jaren werden ze ook telkens gedurende den broedtijd in de Amsterdamsche Waterleidingduinen gezien; in Juni 1928 werd daar voor het eerst een nest met eieren gevonden, welke met succes werden uitgebroed; thans broeden ze er geregeld in enkele paren.

Moederaar.

Blauwe Reiger. Op 8 Februari werden door den jachtopziener van het Zwanewater eenige personen bekeurd, die reigereieren vervoerden. Volgens den bewaker van de Muy op Texel, Frans Stark, hadden de blauwe reigers, welke daar in het riet nestelen omstreeks dezen tijd ook al eieren. In de kolonie van Sloten kwamen de eerste reigers pas terug op 12 Febr. op 25 Febr. zagen we daar de eerste copulatie. Op 1 Maart vonden we in de Sloter kolonie een nest met stukgevroren eieren. Het is zeer waarschijnlijk, dat de reigers welke in boomen nestelen veel meer hinder van laat invallende vorst ondervinden dan in het riet nestelende reigers. Op 17 Juli vonden we in de kolonie op „Eben-Haezer” in den Beemster nog een nest met 3 pasgeboren jongen.

Wulp. Op 9 Augustus zag de heer Stam in de Amsterdamsche Waterleidingduinen een jonge wulp, welke nog niet geheel vliegvlug was. Den zelfden dag werd door hem de eerste doortrekkende Buizerd gezien.

Kleine Plevier. Op 19 Juli vonden we een nest van deze soort met 3 eieren, waarvan er 2 uitkwamen. Op 9 Augustus vonden we de jongen, welke toen naar schatting 2 a 3 dagen oud waren. Op 23 Augustus was een dezer jongen nog niet vliegvlug (het andere jong was waarschijnlijk gesneuveld).

JAN P. STRIJBOS.

Tonijn. Even wil ik U melden dat een collega en ik 1 Nov. j.l. tusschen Bloemendaal en IJmuiden aan 't strand een gedeeltelijke schedel, 7 wervels, 4 onderhuidsche rugvinbeentjes, tong (30 cM.) en twee gedeeltelijke oogen van een Tonijn (*Thynnus thynnus*) vonden. De determinatie geschiedde door Prof. de Beaufort. Na ontvetting zal hij in mijn verzameling, een mooie aanwinst vormen.

Amsterdam, 9 Dec. '31.

M. T. MOL.