

waarin vermeld wordt, dat te Rijsbergen weer een das is gevangen. Ik vind het zoo echt van weinig natuurliefde en veel materialisme getuigend, dat er staat, dat dit dier schadelijk is voor de jacht. Of het schadelijk is voor de natuur (waarin het toch thuis hoort), vraagt men zich echter niet af. Volgens zoo'n redeneering moeten dus alle dieren, die wild eten, hoe zeldzaam ze ook zijn, maar uitgeroeid worden. Maar ja, liefde en eerbied voor andere levende wezens dan de mensch schijnt de doorsnee-Nederlander nu eenmaal niet te bezitten. Misschien heb ik me door m'n jeugdig vuur wat te ver laten gaan, maar ik hoop, dat u het mij niet kwalijk zult nemen. Ik ben ook pas 17 jaar oud en heb dus geen ervaring op dit gebied.

Breda, 24 Jan. '32

J. J. B.

Ik word over vier jaar 71 en heb wel eenige ervaring, maar ik ben het volkomen met je eens. Gelukkig zijn er ook jagers, die dassen beschermen.

THIJSSSE.

Medewerking gevraagd. Bezig zijnde met het samenstellen van een nieuwe lijst der inlandsche schietmotten (Trichoptera) roep ik bij dezen de medewerking in van allen, die door het toezenden van verzamelingen of vangsten der tot deze orde behorende insecten behulpzaam kunnen zijn.

Bronckhorststraat 26, Amsterdam.

F. C. J. FISCHER.

De Overwinterraars. Naar aanleiding van Uw verzoek in De Lev. Nat. van 1 Mei j.l. deel ik U mede, dat ik dit jaar de eerste citroentjes waarnam op 15 Maart te Beetsterzwaag, zoowel ♂♂ als ♀♀. De dieren waren reeds geslachtsrijp, want een paartje, dat ik in een doosje ving, ging onmiddellijk tot copulatie over.

De Atalanta heb ik tot op heden niet gezien. De vroegste datum, waarop ik deze soort waarnam (en ving) is 30 Mei (1931).

Amsterdam, 29 Mei '32.

F. C. J. FISCHER.

Uit het Westerkwartier. Met betrekking tot den vogelstand van Grijpskerk en naaste omgeving, kan ik U mededeelen, dat hier van een vermindering van het aantal Grauwe gorzen en Blauwborstjes gelukkig nog geen sprake is. Wat de Grauwe gors betreft, deze heeft een nogal scherp begrensd gebied. Ten zuiden van Grijpskerk en van het Hoendiep merkt men ze zelden op, echter het noorden in, naar den kant der Lauwerszee, zijn ze in grooten getale.

In 't algemeen mag gezegd worden, dat het aantal vogels, ook in soorten, de laatste jaren wel vooruitgaande is. Merels, Spotvogels, tuinfluiters, grutto's en scholeksters zijn in aantal toegenomen; evenwel lijkt het mij toe, dat Grauwe-Vliegenvanger en Kwartelkoning verminderden. Ook het aantal Pimpelmeesjes is dikwijls niet heel groot, en na een strengen winter zie ik altijd weer minder van deze vogeltjes, ondanks onze goede hulp.

Mijn plan is nu, een soort „volkstelling” te houden in ruimen omtrek, en misschien mag ik dan daarna nog eens op deze zaak terugkomen in Uw tijdschrift.

Grijpskerk, Mei 1932.

J. FEITSMA.

AANGEBODEN:

Recueil des Travaux Botaniques Neerlandais Vol 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28 à f 3.— per deel. Vol 21. Livr. 3 e. 4 f 1.—. Vol 25A. (H. de Vries) f 5.—. Heukels H. Plantenatlas '25 geb. f 1.50. Heimans en Thijssse. In het Vondelpark geb. f 1.— id. Het Wandelboekje '25 geb. f 1.—. C. Zimmer Anleit. zur. beobachtung d. Vogelwelt 2e dr. geb. f 0.50. Kisskalt en Hartmann. Prakt. d. Bacteriologie 5e dr. '28 geb. f 1.50. Nederl. Kruidkundig archief 1921, 1923, '24, '25 '26, à f 1.— p. deel. Tschermak-Becke. Lehrb. d. Mineralogie geb. '24 f 5.—. Pothonie-Gothan Lehrb. d. Palaobotanik geb. 1921 (f 20.—) voor f 9.—. Mevr. Geerts-Ronner. Vacantie in de Bergen f 1.50. Wagner. Geschichte d. Lamarckismus f 1.50. Meded. d. Nederl. Mycol. Vereen. No. 9 t. m. 17, samen f 3.— (ook los). Specht Naumann. Die Vögel Europas Dl. I Lief 1 t. m. 5 à f 0.50 per aflevering.

Chemie. Kristallogr. Mineralogie, (Rinne Engler. Meyer e.a.) geb. (21.—) voor f 6.50.

Alles in zéér goeden staat. Boven f 10.— franco toezending. Binnen 5 dgn. geen antwoord dan verkocht.

Adres: H. HOOGENDOORN, Roodezand 297, Oudewater.