


DE BLADWESPEN VAN MEIJENDEL ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 383

10. de Meyere, Prof. Dr. J. C. H.; Ueber in Farnen parasitierende Hymenopteren- und Dipterenlarven; T. v. E. 54, p. 80, 1911.
11. Nielsen, J. C. og Henriksen K.; Trae- og Bladhvespe; Denmarks Fauna 18, 1915.
12. Oudemans, Dr. J. Th.; Naamlijst der Nederlandsche Tenthredinidae; T. v. E. 37, p. 89, 1894.
13. —; Lijst van Bladwespen gevangen in de Omstreken van Roermond en bij Houthem; Ent. Ber. V, p. 120, 1904.
14. —; *Dolerus thoracicus* Fall., T. v. E. 1909, Versl. p. 47, 1909.
15. —; *Lophyrus nemorum* F. (= *nemoralis* Ensl.); Ent. Ber. V, n. 109, p. 169, 1919.
16. —; *Pristophora fausta* Hrtg., faunae nova species; Ent. Ber. V, n. 108, p. 155, 1919; idem n. 114, p. 260, 1920.
17. —; *Schizocera* (*Apostema*) *geminata* Gmel., fauna nova species; Ent. Ber. V, n. 114, p. 261, 1920.
18. Rohwer, S. A.; *Pteronus xanthostomus* nov. spec.; Ent. Ber. III, n. 59, p. 91, 1910.
19. —; Genotypes of the Sawflies and Woodwasps or Superfamily Tenthredinoidea; U.S. Dep. Agric., Bur. Entom., Techn. Ser. 20, Part. 2, 1911.
20. —; Classification of the Suborder Chalcidogastra of the Hymenoptera; Proc. Ent. Soc. Washington XIII, p. 215, 1911.
21. v. Rossum; *Nematus* (*Pteronides*) *spireae* Zadd.; T. v. E. 43, Versl. p. 15, 1900; idem 44, Versl. p. 26, 1901; idem p. 65; idem 45, Versl. p. 25, p. 72, Tijdschr. p. 246, 1902.
22. —; *Holcocneme coeruleocarpa* Hrtg(? *crassa* Fall); T. v. E. 44, Versl. p. 28, 1901.
23. —; *Nematus melanaspis* Hrtg.; idem p. 32, 1901.
24. —; *Pteronus dilutus* Br.; idem p. 58, 1901.
25. —; *Pteronus dispar* Zadd.; T. v. E. 45, Versl. p. 22—25; idem, p. 67, 71—72, 1902.
26. —; *Selandria temporalis* Thoms.; T. v. E. 48, Versl. p. 14, 1905.
27. —; Mededeelingen over bladwespen I, *Amauronematus fallax* Lep. Ent. Ber. II, n. 35, p. 173, 1907.
28. Thomson, C. G.; Scandinaviens Hymenoptera I, *Tenthredo* L. et *Sirax* L., 1871.
29. Ulbricht; Niederrheinische Blattwespen; Mitt. f. Ver. & Mus. Naturk., Krefeld, p. 20, 1910; Nachtrag I, idem 1913, p. 18.
30. Wagner, A. C. W.; Hautflügler der Niederelbe, I Symphyta; Abh. Ver. f. Naturw.; Unterhaltung 17, 30 p., Hamburg 1924.
31. Yuasa H.; Classification of the Larvae of Tenthredinoidea; Illinois Biol. Monographs 172, p., 14 Pl., 1922.
32. Zeitschrift für Systematischen Hymenopterologie und Dipterologie, 1901—1908.



NIEUWE PLANTENSOORTEN EN VARIËTEITEN, GEVONDEN IN NEDERLAND IN 1932.

Wegens zijn hoogen leeftijd heeft de heer H. Heukels gemeend zijn bekende lijsten over voor ons land nieuwe of zeldzame planten aan andere handen te moeten toevertrouwen. Wanneer wij het aandurven, deze taak van hem over te nemen, dan doen wij dit slechts in de hoop, dat ook wij daarbij de medewerking zullen mogen genieten van de vele floristen, die hun opgaven aan onzen voorganger plachten te zenden. Wij willen echter onze taak niet aanvangen, dan na eerst een woord van hartelijken dank te brengen aan den heer Heukels voor het vele werk door hem in den loop der jaren ten bate van de Nederlandsche floristiek verricht. Het belang toch van deze lijsten voor de geschiedenis onzer floristiek valt niet te loochenen. Reeds in den eersten jaargang van „De Levende Natuur” vinden we den oproep van Heukels om hulp; een oproep waaraan niet minder dan 226 personen gehoor gaven, waarvan het volgend jaar 109 deelnemers bericht inzonden. Natuurlijk slonk dit aantal al spoedig, maar toch bleef er een kern over, voor wie het plantensoeken niet enkel amusement of sport was, maar ook hulpmiddel bij degelijke studie. Vinden we in den loop der jaren niet de helft der tegenwoordige hoogleraren in de botanie onder de medewerkers? Voor iemand,

die als wij, al dien tijd met de lijsten heeft meegeleefd, vormen zij een weerspiegeling van het floristisch gebeuren in Nederland; niet alleen wat personen aangaat, maar ook wat de planten betreft. De opkomst en groote vlucht der adventiefplanten-studie teekent zich in de lijsten af; eveneens de specialiseering der soorten in ondersoorten, variëteiten, vormen, afwijkingen enz.; had iemand een zwak voor het onderkennen van bastaarden, de lijsten getuigen er van. Nieuwe indigenen vinden hier haar eerste vermelding, getuige b.v. *Crithmum maritimum* in deel IV p. 228. Deze soort was toen ter tijd sinds Boerhaave niet meer in ons land aangetroffen en schijnt thans op beide vindplaatsen weer verdwenen. Zeker kan men zoo iets nooit zeggen, in een verloren hoekje kan de plant hebben standgehouden. Een analogon vonden we dezer dagen in het terugvinden van het levermos *Bazzania trilobata* door Joh. Jansen, welk mos, ook wel geheeten *Mastigobryum trilobatum*, slechts eens in 1846 in ons land was aangetroffen. Vooral op mossengebied zijn dergelijke buitenkansjes meer te verwachten. Mochten er onder de lezers zijn, die zich met mossenstudie bezighouden en hun vondsten gaarne gecontroleerd zagen, dan zijn wij daar gaarne toe bereid, en waar het aantal medewerkers voor de hogere planten sterk gedund is, hopen wij van harte, dat wij voor het volgend jaar van talrijke nieuwe hulpmiddelen opgaven zullen ontvangen. Echter zullen wij alleen dié opgaven vermelden, waarvan wij de planten — levend of gedroogd — hebben gezien. Desgewenscht zullen zij steeds teruggezonden worden.

Ir. A. W. KLOOS Jr., Nieuweweg 40, Dordrecht.

W. H. WACHTER, Vierambachtstraat 81a, Rotterdam.

In deze en de volgende lijst beteekent:

(D.) W. van Dijk te Overveen. (G.) J. v. Giersbergen te St. Michiels Gestel. (Joh. J.) Joh. Jansen te Malden. (J. W.) P. Jansen te Amsterdam en W. H. Wachter te Rotterdam. (K.) A. W. Kloos Jr., te Dordrecht. (P. S.) J. Prins en J. Schoute te Amsterdam. (Un.) Excursie van de Nederlandsche Botanische Vereeniging.

Aspidium Deweveri. Joh. Jansen = *A. spinulosum* × *dilatatum*. Hatert sedert enkele jaren en Malden 1930 (Joh. J. in N.K.A. 1932, p. 298).

Equisetum litorale. Kühlewein = *E. arvense* × *heleiocharis*. St. Agatha en Plasmolen (Joh. J.).

Allium karataviense. Rgl. Heemstede 1931 (J. Boting en D. in N.K.A. 1932, p. 374).

Trillium erectum. L. Ulvenhoutsche bosch (Th. Neve).

Juncus conglomeratus. var. *subuliflorus*. A. en G. Plasmolen (Joh. J.).

Carex Crawfordii. Fernald. Veghel 1926 (J. Kern en B. Reichgelt in N.K.A. 1932, p. 355).

Scirpus lacustris. var. *glaucescens* (Schult.) A. en G. Neerloon (Joh. J.).

Panicum laevifolium. Hack. Amsterdam 1931 (P. Jansen en G. Kruseman, vorig jaar opgegeven als *P. dichotomiflorum*).

Echinopogon ovatus. P. B. Amsterdam 1930 (M. Jacobs).

Bromus lepidus. Holmb. Rotterdam 1906. Weert 1918, Loenen, Amsterdam 1927, Kolhorn, Nijmegen (J. W. in N.K.A. 1932, p. 317).

Monolepis chenopodioides. (Nutt.) Moq. Wormerveer 1930 (K. in N.K.A. 1932, p. 375).

Chenopodium suecicum. Murr. Deventer 1931 (K. in N.K.A. 1932, p. 376).

Chenopodium rubrum. f.m. *laxiusculum*. Zap. Wormerveer 1925 (K.) Amsterdam (D.).

Gypsophila porrigens (L.) Bois. Deventer (Mej. T. Tonkes en Prof. Dr. B. H. Danser).

Claytonia virginica L. Haarlem (D.).

Capsella Bursa pastoris. var. *Heegeri* Solms. Wassenaar 1929, Prof. Dr. L. H. Siertsema in N.K.A. 1932, p. 379).

Acalypha virginica. L. den Bosch (G. K.).

Oenothera biennis. f. *ochroleuca* Hermann. den Bosch (G. K.).

Oenothera pumila. L. Aerdenhout 1931 (D. in N.K.A. 1932, p. 390).

Oenothera odorata. Jacq. Renesse 1929 (Un. in N.K.A. 1932, p. 390).

NIEUWE PLANTENSOORTEN EN VARIETEITEN IN NEDERLAND 385

- Trigonella monantha*. C. A. Mey. Amsterdam (P. S.).
Atropa Belladonna L. met gele bloemen. Amsterdam (P. S.).
Arnica montana f. *corymbosa* Fiore. Drenthe (Prof. Dr. L. H. Siertsema).
Centaurea diffusa fl. *rosea*. Wychen (Joh. J.).
Crepis biennis var. *lorifolia* Beck. Heusden (Un.).

NIEUWE VINDPLAATSEN IN NEDERLAND VAN ZELDZAME PLANTENSOORTEN IN 1932.

- Endymion campanulata* fl. *albis*. Vogelenzang (D.).
Sisyrinchium angustifolium. Dordrecht (K.).
Cyperus fuscus met var. *virescens*. Heusden (Un.).
Carex brizoides. Weert (D.).
Scirpus lacustris var. *salina*. Oost-Voorne (Dr. W. C. de Leeuw).
Andropogon halepense. den Bosch (G. K.).
Leersia oryzoïdes. Heusden (Un.). Raamsdonk (K.).
Lagurus ovatus. Amsterdam (P. S.).
Briza maxima. Kienum (Terschelling) 1930. (G. W. Jongens). Amsterdam (P. S.).
Briza minor. Nieuweramstel 1929 (P. S.).
Eragrostis suaveolens. Wormerveer (K.).
Aegilops cylindrica. Amsterdam 1931 (P. S.).
Parietaria ramiflora. Bokhoven (Joh. J.).
Rumex fennicus. Wormerveer 1930 (K. in N.K.A. 1932, p. 375).
Corispermum hyssopifolium. Amsterdam (P. S.).
Chenopodium capitatum. Amsterdam (P. S.).
Salsola kali pseudotragus. Amsterdam (D. P. S.).
Axyris amarantoides. Bakkum 1931 (P. S.).
Amarantus pseudoretroflexus. Amsterdam (D.) den Bosch (G. K.).
Amarantus chlorostachys. Amsterdam (P. Jansen en G. Kruseman).
Amarantus lividus. Heusden (Un.).
Dianthus caryophyllus. Noordwijk (D.).
Glaucium corniculatum. Amsterdam (P. S.).
Fumaria capreolata. Babberich (G., Joh. J. en P. Donatus).
Arabis arenosa. Amsterdam 1928 (P. S.).
Lepidium virginicum. Weert (D.).
Lepidium neglectum. Amsterdam (P. S.).
Rapistrum perenne. Amsterdam (P. S.).
Rapistrum rugosum orientale hirsutum. Amsterdam (P. S.).
Elatine Hydropiper. Heusden (Un.), Dordrecht (K.).
Malva moschata. Wijkel-Sondel (Hr. en Mevr. Koopmans).
Budleya variabilis. den Bosch (G. K.).
Oenothera laciniata. Vogelenzang 1931 (P. S.).
Ammi visnaga. Amsterdam (P. S.).
Ridolfia segetum. den Bosch (G. K.).
Pimpinella magna f. *rubella*. Balgooi (Joh. J.).
Bifora radians. Weert (D.).
Coriandrum sativum. Amsterdam 1928 (P. S.).
Rubus laciniatus. Amsterdam 1930 (P. S.).
Medicago hispida denticulata en *apiculata*. Amsterdam (P. S.).