

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

De Hop op Texel. Is het misschien voor De Levende Natuur nog vermeldenswaard, dat ondergeteekenden op Texel een *hop* gezien hebben? Hij vloog over de dennen (bij Fontein-nol) en streek neer in het aangrenzende weiland op een 20-tal meters van ons af, en bleef hier eenigen tijd, steeds pikkend, rondstappen. Op dezen korten afstand hebben wij hem een 10-tal minuten prachtig kunnen bekijken met onze prisma's. Het was op 17 Oct. om pl.m. 12.15. Het was midden in den trektijd. Het zal dus wel een trekker geweest zijn. Het geluid hebben we niet gehoord. Ook niet bij het opvliegen.

Amsterdam, 1 Nov. '34.

F. BLOEM.

L. A. DROST.

Zou 't waar zijn? Onderstaande mededeeling in de „Haagsche Post” (Techn. Post) van 22 dezer trok mijn aandacht.

„*Boschbrand en Vogels.* Nadat zorgeloze bezoekers en wandelaars de schuld van boschbranden hebben gekregen schijnt het nu, dat de vogels minstens even veel schuld hebben. Verschillende waarnemers hebben opgemerkt, dat sommige vogels een liefde hebben opgevat voor tabak en graag eindjes sigaret, brandend of niet, oppikken en naar hun nesten brengen, waar ze dan, in aanraking met het droge nestmateriaal en te midden van een goede ventilatie, brand kunnen veroorzaken. Dit moge een extra waarschuwing zijn, vooral geen brandende eindjes weg te werpen, ook niet op plaatsen, waar geen onmiddellijk brandgevaar bestaat”.

Acht ook U het mogelijk, dat daarin vermelde brandoorzaak als juist kan worden aangenomen? Omdat vogels in het algemeen afkeer van rook hebben, komt 't mij vreemd voor, dat er vogels zijn (welke?), die met brandende eindjes wegvliegen.

Zeer aangenaam zal het mij zijn, Uw meening te mogen vernemen.

Arnhem, 24 Sept. '34.

G. TH. DE VRIES.

Ik geloof daar niets van. Weten onze lezers het beter?

T.

Een Arend? Deze week kwam een veehouder bij mij met een groote roofvogel, dood. De vogel was zoo goed als gelijkmatig donkerbruin, ook de vleugels en de staart, de staart zonder band en *niet* gevorkt. De borst en kuiten ook dezelfde kleur. De kop is van boven, van achter en aan de keel, heel licht geelbruin (witte veertjes met donkere punten). Snavel zwart. De lengte van vleugelpunt tot vleugelpunt is 125 cm. De vogel werd in het land gevonden met glad afgeslagen loopbeenen, terwijl de kop aan een lang stuk vel er bij hing, ook verder geheel afgeslagen. Het gras er omheen was iets bebloed. De pooten waren niet te vinden. Ik vermoed, dat de vogel is geraakt door een vliegtuigschroef, misschien wel als aanvaller. Is dat mogelijk?

Purmerland, 2 Oct. '34.

J. DUPUY.

Best mogelijk, dat een vliegtuig het gedaan heeft. Ik heb in het Naardermeer dikwijls de Bruine Kickendief „nieuwsgierig” naar een vliegtuig heen zien vliegen.

T.

De Maro-Bijenfilm. Dit is een nieuwe film over het leven der honingbij en het imkers-bedrijf. De samensteller heeft er jaren aan gewerkt en met bewonderenswaardig resultaat. Alle beroemde bijzonderheden uit het bijenleven vinden we hier heel duidelijk en fraai weergegeven: het eierleggen, voeren, de koningin met haar „eewacht”, de veelbesproken vreugdedans der werkbijtjes, die overvloedig voedsel hebben gevonden, de wasproductie, de reiniging van de korf, de strijd met de indringers, het uitdrijven der darren enz. enz.

Daarnaast komt dan het imkersbedrijf met al zijn listige kunstgrepen en als kroon op het werk de groote bijenmarkt te Veenendaal.

En door alles heen wondermooie opnamen van de bijen, arbeidend op de bloemen, de een al mooier dan de ander, daaronder een buitengewoon goed geslaagde, die laat zien, hoe de bij via voorpooten en middenpooten het stuifmeel bevestigd op het korfje aan de achterpooten. Trouwens de heele film is een aaneenschakeling van dergelijke leerzame details, gedragen door het onverbreeklijk samenleven van bij en bloem.

T.

Houtsnippen en Paddenstoelen. Bij de gelegenheid van de trekwaarnemingen op Texel eind October j.l. vonden we in de bosschen van het Staatsboschbeheer heel wat boleten n.l. de fluweelboleet (*Boletus subtomentosus*), de melkboleet (*Boletus granulatus*), dek ocienboleet (*Boletus bovinus*) en het eekhoortjesbrood (*Boletus edulis*) uitgegeten door vogels. Van enkele was ongeveer al het hoedvleesch weggegeten, terwijl andere slechts een of meer snavelpikken vertoonden. Na eenig onderzoek kwamen we tot de ontdekking, dat de houtsnippen hieraan