

## VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

**Het zachte najaar van 1934.** Laat ons eenige feiten opteekenen ter vergelijking met andere jaren. Korenbloemen ontkiemd in September staan nu (11 Dec.) in bloei, tegelijk met Hutchinsia, die in mijn tuin al aardig een concurrent begint te worden van de gewone sterremuur. Dotterbloem bloeit nog langs slooten in den Leidschen Hout. Uitheemsche heesters botten uit zooals Ribes alpinum, Ribes rubra. Dag- en Avond Koekoeksbloem zijn blijven bloeien, evenals Gevlekte, Witte en Paarse Doovenetel. Gaspeldoorn staat bijzonder rijk in bloei, Bitterkruid bloeit nog. Kiemplanten van Slaapbol blijven stevig doorgroeien. De Kleine Teunisbloem houdt ook nog vol. Een Zanglijster zingt hier al sinds de laatste dagen van November. In een enkelen tuin vertoont de Narcis al bloemknoppen. De Hazelaar bloeit op beschutte plaatsen. De Bonte Specht kwam hier naar zijn trommelboom, bekeek de vier dorre takken van zijn instrument en elk oogenblik dacht ik, dat hij zou gaan roffelen, maar hij deed het niet. Dit voorjaar zag ik hem voor het eerst roffelen op 14 Januari. Nu verwacht ik het iederen dag. Een gewone pad kuierde door mijn tuin op 21 November. Toen vloog ook nog een Vleermuis. Een Campanula latifolia staat 15 December prachtig te bloeien in Thijsse's Hof. Dienzelfden dag wordt de rijk bloeiende klimop nog druk bezocht door de welbekende dikke blauwe vliegen (Pollenia en Mesembrina), zong een Groote Lijster op Hartelust en maakte een Bonte Kraai op zijn eentje darteel buitelvuchten in het weiland aan de Delft. Maar daar staat tegenover, dat wij hier Winterkoning, Boomkruiper, Pimpelmees niet zoo druk hooren zingen als in normale winters. Dat kan een plaatselijk ongevalletje zijn, maar wij moeten er elders toch ook even op letten.

De Zomerfijnstraal (*Stenactis*) blijft nog steeds bloeien, ook eenige eerste-jaarsplanten en die heel mooi met diep blauwe straalbloempjes. Een verplante linde maakt mooi frisch groen voorjaarsblad. Over het algemeen kan gezegd worden, dat de „abnormale” verschijnselen zich vooral voordoen bij planten die de een of andere schok te verduren hebben gehad, of bij uitheemsche planten, dat zijn dan die in parken en tuinen en de onkruiden. In het duin of op de heide zien we een ietwat weelderiger groei van de najaarsontkiers, een rijker bloei van Gaspeldoorn, een later bloei van heide, een langer duur van Paddenstoelen, een drukker werkzaamheid van den Driehoornkever, een vollediger verhouting van jonge twijgen. Maar ik zal er heel dankbaar voor zijn, wanneer onze lezers en lezeressen hier ook hun bevindingen willen vermelden.

JAC. P. TH.

**De broedvogels van Voorne's Natuurmonumenten.** Naar aanleiding van genoemd artikel zond de Heer J. van Hoey Smith van Oost-Voorne mij de volgende waarnemingen: 18. *Watersnip* is een zeer algemeene broedvogel. ad. 24. *Blauwe reiger* is geen broedvogel in het reservaat, maar wel in een kolonie op de buitenplaats Mildenburg. *Purperreiger*. Deze zomer geregeld in het Quakjeswater in meerdere ex., niet broedend. *Woudaapje*. In den zomer '34 geregeld 1 of 2 ex. in het Meertje de Waal, geen nest gevonden. Een nieuwe broedvogel voor het Breede Water is 61. *Lepelaar*. 1 paar heeft gebroed, eieren onbevruucht en meerdere ex. hebben speelnesten gemaakt, vermoedelijk het begin van de vorming van een kolonie. ad. 29. *Boschuil*, hoewel algemeen op Oost-Voorne nog geen broedvogel in het reservaat. 62. *Nachtzwaluw*. Komt tegenwoordig wederom veel voor, den geheelen zomer door en diens volgorde natuurlijk ook broedend.

Ik zelf hoorde nog even buiten het reservaat op 27 Mei 1934 de *Zwartkoptuinfluit* zingen. Wij zijn nu vol verwachting, of 1935 ons een blijvende vestiging van Lepelaars en Roode Reigers zal brengen.

Haarlem, 20 Nov. '34.

L. v. 'T SANT.

**Najaarsbloei.** In verband met D. L. N. Nov. p. 231 „Tweede bloei of vroegbloei?” wilde ik U nog mededeelen, dat *Ajuga reptans* sinds enkele weken weer volop bloeit in onzen tuin.

Het merkwaardige vond ik, dat juist de na den zomerbloei gevormde uitloopers in bloei zijn geraakt — terwijl deze, als ik me niet vergis, toch gewoonlijk pas den eerstvolgenden zomer bloemen geven, als ze wortel hebben geschoten en een rozet hebben gevormd. Dit deed mij tenminste ook direct aan abnormale vroegen bloei denken. Of is het verschijnsel gewoon, zooals b.v. bij de maagdepalm, die ook al de heele maand October en November bloeit?

Langeweg.

P. BENNO.

**Wandelende Tak.** Nog moet ik U mededeelen, dat wij dezer dagen een Wandelende Tak (verm. *Bacillus Rossii*) vonden in het raamkozijn, dat door klimop is omgeven. Wel zijn er hier ooit enkele exemplaren binnenshuis gekweekt; maar dat is minstens 3—4 jaren geleden — dus toch merkwaardig genoeg, als deze vluchteling 't zoolang zou uitgehouden hebben in de