De Levende Natuur 41 (7):223-223 (1936)

geluiden en bewegingen, alsof hij zich binnenste-buiten keerde. Door z'n grootte maakten we uit, dat het geen kraai kon zijn; hij was zwart van top tot teen en blauwglanzig.

De Heer Wolda vertelde ons dat het laatst bekende broedend paar in het Linschoterbosch was gezien 8—9 jaar geleden, en dat het waarschijnlijk een trekker was. Worden deze wel meer gezien?

Wageningen, 9 Oct. 1936. J. PH. LAMAN TRIP.

Dubbele Parnassia. Zaterdag j.l. hebben we op het Groene Strand van Voorne dubbele bloemen van Parnassia gevonden. De gelukkige vinder was de jongeheer Raue die met de Afdeeling Brielle van de Nederl. Natuurh. Vereeniging de excursie meemaakte. Er stonden verschillende exemplaren alle met veel bloemblaadjes (petaloïde meeldraden?) Het waren net kleine roosjes.

Hellevoetsluis 30 Sept. '36.
W. K. STEFFEN.

Foto Steffen.

Parnassia met gevulde bloemen.

Aalscholvers met gekleurde ringen. Teneinde aalscholvers individueel in het veld te kunnen herkennen, hebben wij dit jaar een aantal jongen behalve van de gewone aluminiumring bovendien nog van drie gekleurde celluloïdringen voorzien. Mocht U er één van zien, dan houd ik me zeer aanbevolen voor een bericht. Men notere niet alleen de kleuren doch vooral ook de combinatie ervan, benevens de tijd en het gedrag van de vogel. Ook zij men erop bedacht, dat, als men een aalscholver van voren ziet, men de linkerpoot rechts en de rechterpoot links voor ogen krijgt.

Het noteren geschiedt aldus:

Ringen			Datum	Tijd	Plaats	Gedrag
	links	rechts	20-7-'36	13.35 u.	Lekkerkerk Z.W. hoek, Vak C, dichtbij Vak B.	Rustig vleugeldrogend en toiletmakend.
boven	wit	wit				
onder	rood	groen				

In de ringlijst vinden we dan, dat bijv. bovenstaand ex. geringd werd te Lekkerkerk op 23-5-'36, geboortedatum pl.m. 24-4, Leids nummer 152355, andere terugmeldingen 14-7 en 17-7-'36.

Van witte ringen hoeft niet opgegeven te worden, of ze van celluloïd of van aluminium vervaardigd zijn. Wel lette men goed op het verschil tussen wit en geel, daar de gele ringen (naar achteraf bleek) in het veld een witte indruk maken en ook omgekeerd, al naar de belichting.

Met een goede kijker zult U de aalscholvers op kaden en strekdammen misschien wel eens kunnen identificeeren. Bij goed licht en zonder kijker zal dat op een afstand van 10 a 20 meter mogelijk zijn.

Oldenbarneveltlaan 24, Hillegersberg. A. KORTLANDT.

Amsterdam, die groote stad. Onze medewerker de heer Ad. C. P. Baars, zond ons een paar uitknipsels uit het Handelsblad van 8 Juni '36. Daarin wordt vermeld, dat in een vliegaschberg aan de overzijde van het IJ een dertigtal oeverzwaluwen nestelden en dat lepelaars zich geregeld vertoonen aan den Rothoek.

Ik weet nu al meer dan vijftig jaar, dat de omgeving van Amsterdam den jongen (en ouden) onderzoeker volop bevrediging kan geven. Maar wij krijgen wel nieuwe grondslagen: moddergaten, aschhoopen, rioolmondingen, vloeivelden. Maar gelukkig is er ook nog „echte" natuur.

T.