

omvat, zal voortdurend deskundige voorlichting worden verstrekt, terwijl geregeld rondleidingen zullen plaats vinden.

Reeds nu blijkt in kringen van den meest verschillenden aard groote belangstelling te bestaan. Vooral natuur-, sport- en jeugdorganisaties geven reeds het voornemen te kennen speciale excursies naar deze tentoonstelling te zullen organiseren.

De toegangsprijs bedraagt 10 cts., in groepsverband 5 cts.

Voor Amsterdamsche scholieren in klasseverband en werkloozen in groepsverband is de toegang gratis.

Aanmelding voor excursies dient te geschieden Raadhuis — Amsterdam, kamer 138, telefoon 43130, toestel 471.

Vogels van Zuidholland. Den 21en Maart j.l. werd door mij een ruigpootbuizerd waargenomen, cirkelend boven de 's-Gravenhaagsche Westduinen (achter de Boschjes van Poot). De donkere vlek op den lichten onderkant der vleugels vormt inderdaad een goed kenmerk.



In den Vogeltuyn in Den Haag (een afgerasterd stukje gemeentegrond in gebruik bij de Alg. Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken) had in de maand Mei van dit jaar een pimpelmees in een nestkastje een legsel van veertien eieren. Is dit niet een record? Acht eieren zijn ervan uitgekomen.

Den 21en Juni van het vorige jaar werd onder Moerkapelle a/d Rotte een waterhoen broedend op drie eieren van een waterhoen en vier van een meerkoet aangetroffen. (Zie foto: waterhoen-eieren 2 rechts en 1 voor-aan). Komen zulke gemengde nesten wel voor zonder dat er menschenhanden in het spel zijn geweest? Dezelfde vraag kan ook bij de volgende waarneming gesteld worden.

Den 8en Mei van dit jaar werd in een afgezet gedeelte van de Westduinen onder de gemeente 's-Gravenhage een verlaten nest gevonden, waarin zich vijf eieren van een fazant en elf van een patrijs bevonden.

Den Haag 25 Juni '36.

B. NIEUWENHUIS.

Waterhoen broedt op drie waterhoen eieren (rechts onder) en vier meerkoeteneieren. Moerkapelle a. d. Rotte, Juni 1935.

Het nest zat in een heg op manshoogte, gemakkelijk te controleren met een spiegeltje. Het jonge merelpaar nestelde normaal, 4 eieren werden gelegd en bebroed. Dit broeden duurde echter abnormaal lang. Na 3 weken waren de eieren nog niet uitgekomen, en de 22e of 23e dag waren plotseling alle 4 eieren verdwenen en het nest leeg. Sporen van eenig geweld waren niet te vinden, en de merels gedroegen zich bedaard normaal. Precies den volgenden dag verscheen wederom een eitje, waarna het nest weer voltallig kwam met 4 eieren. Dit legsel kwam na 12 dagen uit.

Is het mogelijk, dat de merels de blijkbaar onbevuchte eieren in den bek hebben genomen en ver weg hebben vernietigd? Tot onze grote spijt heeft niemand van deze opruiming iets gezien.

Eindhoven, 3 Juni '33.

Mevr. BOUMA.

Ja, het is heel goed mogelijk, dat de merels zelf die eieren verwijderd hebben. Dat een merelwifje een dood jong uit het nest wegsjouwde, heb ik zelf gezien.

T.

Op de Veluwe. In het laatst van Maart j.l. kwam een wijfjesooievaar op haar nest „wat meer dan 70 jaar heeft bestaan”, terug, en begon al spoedig het nest in orde te brengen. Aan haar handelwijze bleek, dat zij na verloop van 14 dagen eieren had gelegd, terwijl juist in die dagen een mannetjes ooievaar op 't nest verscheen.

In elk geval is het wijfje hoogstens 3 dagen na de komst van het mannetje beginnen te broeden. Na verloop van 10 à 12 dagen begon het wijfje de eieren uit het nest te werpen, welke onbevucht bleken te zijn.