

ook op zaailing linden. Die zien er alleraardigst uit met hun gelobde kiemblaadjes, Zaailing-ahorns zien we zoo veel we willen; voor de aardigheid kijken we nog eens uit naar drielobbige, vierlobbige of zelfs vijflobbige ahorntjes.

In den regel verdwijnen de meeste bonte kraaien omstreeks 1 April, maar ditmaal bleven er nog heel wat toeven tot 20 April, ook ettelijke kauwtjes. In de kou bleven de broedende kievitten veel langer dan anders op hun eieren zitten, bleven er zelfs op als we dicht langs het nest reden zoo ook de wulpen en de grutto's. In hun zang lieten de vogels zich weinig storen; telkens staat er in mijn dagboek: „fitis zingt even druk als altijd (14 April, 18 April) prachtige zang van groen-vink, mooie zang van fitis en roodstaart (10 April), drukke zang en „gevecht” van schildvinken met veel vertoon van de witte schouderplek (10 April). Normaal is het, dat de Groote Lijster om dezen tijd allengs minder gaat zingen. Ook de Bonte Spechten raken uitgetrommeld; de Groene en de Zwarte blijven joelen tot in Juni.

Een aardig geval was het met de padden. Die hadden in de laatste week van Maart een drukte gemaakt van belang en in hun honderden de oevers van den vijver in Thijssse's Hof bezet. Maar toen de koude inviel hielden zij zich koest, de eiërmasse's verdwenen en eerst in de laatste week van April begonnen zij opnieuw met veel animo.

En nu maar weer de nieuwe April tegemoet. Altijd weer hetzelfde en telkens wat anders.

JAC. P. THIJSSE.



NIEUWE PLANTENSOORTEN EN VARIËTEITEN GEVONDEN IN NEDERLAND IN 1936.

In deze en de volgende lijst staat (B.R.) voor B. Reichgelt te Nijmegen, (G.) voor J. v. Giersbergen te Sint Michiels Gestel, (J.) voor P. Jansen te Amsterdam, (K.) voor J. Kern te Vlaardingen, (K.B.R.) voor Kern en B. Reichgelt, (K.Th.R.) voor Kern en Th. Reichgelt, (K.R.R.) voor Kern en beide Reichgelt's, (Kl.) voor Ir. A. W. Kloos Jr. te Dordrecht, (N.J.N.) voor Nederlandsche Jeugdbond voor Natuurstudie, (P.) voor J. J. Piet te Eindhoven, (Sl.) voor Jan G. Sloff te Bergen op Zoom, (So.) voor Ir. J. L. van Soest te 's-Gravenhage, (Th.R.) voor Th. Reichgelt te Nijmegen, (Un.) voor Excursie Eibergen van de Ned. Bot. Ver., (W.) voor Prof. Dr. Th. Weevers te Amersfoort.

Ventenata dubia (Leers.) Coss. te Deventer (Exc. Zuiderzee Commissie).

Cornucopiae cucullatum L. te Amsterdam (G. de Bruin).

Chenopodium acuminatum Willd. te Deventer (Gorter, de Jong, J., Kl.).

Kochia scoparia var. *Sieversiana* (C. A. Mey) A. et G. te Deventer (id.).

Salsola collina Pall. te 's-Hertogenbosch (G. 1935).

× *Polygonum subglandulosum* Borb. te Dalen (K. 1935).

Melandrium rubrum parviflorum Kloos te Eibergen (Un.).

Papaver dubium fl. *albis* te 's-Hertogenbosch (G. 1933), te Deventer (Exc. Zuiderzee Comm.).

Fumaria Schleicheri Soy-Will. te Nijmegen (B.R. 1931).

Hirschfeldia incana var. *incana* (L.) Thell. f. *dasycarpa* (Lange) Thell. te Wychen (Joh. Jansen).

id. id. f. *leiocarpa* Lowe te Rotterdam (K.), te Wychen (Th. R.).

id. var. *geniculata* (Desf.) Thell. te Amsterdam (Dr. J. Th. Henrard 1910), te Wormerveer (Kl. 1929).

Thlaspi alpestre var. *calaminare* f. *prolifer* te Epen (dames Dooge en v. Driel).


Viola mirabilis L. te Bennekom (Prof. Dr. J. Jeswiet).

Viola cornuta L. te Leersum-Broekhuizen (Prof. Dr. W. M. Docters van Leeuwen).

NIEUWE PLANTENSOORTEN ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ 739

- Viola tricolor* L. *stenochila* Wittr. de duinviooltjes op Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog.
 id. id. *coniophila* Wittr. de duinviooltjes in de N. en Z. Hollandse duinen.
Geranium pusillum f. *albiflorum* Schur. te Wassenaar (Prof. Dr. S. E. de Jongh).
Saxifraga decipiens Ehrh. te Uithoorn (A. Gorter 1935).
Epilobium Lamyi F. Schultz te Lent (K.B.R. 1925).
Genista anglica var. *splendens* Kloos te Haps (Joh. Jansen).
Veronica filiformis Smith te Heemstede (J. Roggeveen).
Verbena bipinnatifida Nutt. te Erp (K.R.R.).
Campanula lactiflora Bieb. te Dordrecht (Kl.).
Achillea ptarmica f. *discoidea* te Overasselt (Joh. Jansen).
Helenium autumnale L. te Eibergen (Un.).
Artemisia Verlotorum Lamotte te Wormerveer (Kl. 1913, 1914), te Deventer (Kl. 1931).
Artemisia Mexicana Willd. te Deventer (Kl. 1931).
Artemisia salsoloïdes Willd. te Deventer (Kl. 1931).
Artemisia sacrorum Ledeb. te Deventer (Kl. 1931).

Ir. A. W. KLOOS Jr., Dordrecht.
 W. H. WACHTER, Rotterdam.

NIEUWE VINDPLAATSEN IN NEDERLAND VAN
ZELDZAME PLANTENSOORTEN IN 1936.

- Aspidium Oreopteris* te Eibergen (Un.), te Winterswijk (N. J. N. Kamp Kotten), te Strijp (P.)
Phegopteris Robertianum te Winterswijk (N.J.N.kamp Kotten).
Equisetum silvaticum te Hoogeloon (P.).
 × *Equisetum litorale* te Eibergen en Haaksbergen (Un.).
Najas marina. Nieuwkoopse plassen (Prof. Dr. Th. J. Stomps).
Carex brizoides te Wassenaar (Prof. Dr. L. H. Siertsema).
Carex Pairaei te Meerwijk (Joh. Jansen).
Carex limosa te Geldrop (P.).
Eriophorum gracile te Veldhoven en Lierop (P.).
Eriophorum latifolium te Stiphout (P.).
Phleum paniculatum te Wychen (Th. R.).
Eleusine tristachya te Wychen (K. Th. R.).
Spartina Townsendii op de Beer (W. v. d. Kloot).
Glyceria retroflexa op Goeree (W.).
Glyceria maritima × *retroflexa* te 's-Gravenpolder (J. Sl.).
Glyceria distans × *Sclerachloa Borreri* te 's-Gravenpolder (J. Sl.).
Cynosurus echinatus te Groesbeek (Joh. Jansen).
Triticum prostratum te Wormerveer (Kl.).
Bromus madritensis te Rotterdam (K.).
Bromus unioloides parviflorus te 's-Hertogenbosch (Kl.).
Eragrostis pilosa te 's-Hertogenbosch (G. Kl.).
Spiranthes autumnalis te Aalst en Geldrop (P.).
Spiranthes aestivalis te Geuven en Aalst-Geldrop (P.).
Goodyera repens te Boekelo (d. hr. Loonen), te Moerstraten (A. I. A. de Kok).
Scheuchzeria palustris te Stratum (P.).
 × *Polygonum Braunianum* te Dalen (K. 1935).