

echter niet veel van aantrok. Toen kreeg de kikker een paar fiksche houwen en bleef liggen. De vlaamsche gaai trok verder. Misschien had het voorzichtig openen van de tuindeur hem daar aanleiding toe gegeven. De kikker lag nog op het slagveld. 't Bleek, dat het dier geen wonden vertoonde, behalve dat beide oogen waren uitgepikt. 't Onderzoek deed het dier wat bijkomen en 't sprong nog verder. Zonder de pooten mat de kikker 6,5 cm.

Bergen Binnen, De Haaf.

D. MAC GILLAVRY.

**Kluten in de Dollart.** Op Maandag 30 Aug. j.l. nam ik op het z.g. Reide (dat is de landpunt die vlak tegenover de Duitse stad Emden in de Dollart steekt) vijf kluten waar. Als we zien dat deze vogels niet worden genoemd in de door Van Dobben en Makkink gepubliceerde lijst van op Rottumeroog en aan de Friese kust waargenomen soorten en in vier jaren tijds van bijna onafgebroken waarnemingen door den jachttopziner van Schiermonnikoog ook nooit is opgemerkt, meen ik dat dit een vrij zeldzame waarneming is.


Hoogezand.

Tijs G. VISSER.

**Wintermuggen.** Nu er bij het naderen van de wintertijd steeds minder gelegenheid blijft voor het doen van entomologische waarnemingen, kan men zijn aandacht eens bepalen bij de wintermuggen (*Trichocera*), waarvan de soort *T. hiemalis* juist boven sneeuw steeds maar in

kleinere of grotere zwermen in de lucht danst. Wanneer men nu een witte lap op de bleek, achter het huis legt, zal er al gauw zo'n zwerm boven komen, en verplaatst men dan de lap dan gaan de wintermuggen mee. Bepaald vermakelijk was het, toen onze witte kat laatst op de bleek speelde. Er vormde zich al spoedig een kleine zwerm boven, op anderhalve meter hoogte. Maar sprong de kat dan weg, dan stooft de zwerm eveneens weg, en verzamelde zich in enkele seconden weer boven de kat. Een andere soort, *T. regelationis*, doet juist het tegenovergestelde. Die danst boven een zwarte ondergrond, bv. een plek, waar de sneeuw weggesmolten is en laat zich ook beetnemen met een stukje asfalt, een oude mat of iets dergelijks op de bleek.

*Trichocera  
regelationis* L.  
"2 = 2.9. axillaris.



Vleugel van een Wintermugje.

Uit *Trichocera* *regelationis* L. (2 = 2.9. axillaris).

Oude-Pekela, 27 Oct. 1937.

J. MART. DUIVEN.

**Klein Springzaad.** *Impatiens parviflora* werd deze zomer door mij gevonden in Hilversum en wel op de Trompenberg en bij het Gooische gat.

Groningen.

Dr. S. J. DIJKSTRA.

**Klein Springzaad.** In No. 1 van de loopende jaargang van De Levende Natuur gaf ik mijn voornemen te kennen klein springzaad op een afgelegen plek van mijn erf uit te zetten. Op een wandeling in het voorjaar bleek mij, dat achter het Hof te Bergen bij de boerderij Oostdorp de berm van de weg volstaat met klein springzaad. Uitzetting in Bergen N.H. is dus reeds vroeger geschied, of zou de plant er nog van vroeger zijn?

In No. 3 van jaargang XLII raadt de redacteur aan gevallen van uitzetting in nieuwe omgeving aan het Instituut voor Vegetatie Onderzoek in Nederland te willen melden. Ware het niet aan te bevelen, daartoe het adres van genoemd Instituut hierbij mede te delen? D. MAC GILLAVRY.

Dit adres is: J. G. SLOFF, Halsterscheweg D 78, Bergen op Zoom.

#### GEVRAAGD :

Ter Haar, Onze Vlinders. Binnen 10 dagen geen antwoord dan voorzien.  
Adres: G. PRINSZE, Parallelweg 64, Koog aan de Zaan.

Een Mineralogie (geb.) van Tschermak, Naumann-Zirkel, Groth of ander.  
Prijsofgave P. VAN DER LIJN, Joh. Geradtsweg 49, Hilversum.

Veertig jaren Spoor en mijnen in Zuid-Limburg.  
Aanbieding aan Dr. J. C. VAN DEN BOSCH, Tramlaan 13, Steenwijk.

#### AANGEBODEN :

Een geheel nieuwe Avifauna der Nederl. Prov. Limburg, door P. A. HENS, 1926, voor f 4.50  
Adres: M. DE KONING, Ernst Casimirlaan 66, Arnhem.