

Nog eens heksenkringen. Op Elswoud fotografeerde ik op 15 November 1936 een heksenkring van de Nevelzwam onder oude beuken, in een dek van beukenblad. Grond gelijkmatig en vrij wel horizontaal. De kring had een middellijn van 8 meter en telde 360 hoeden. Hij werd gemarkeerd door stokjes. In 1937 bleek hij naar alle kanten driekwart meter gevorderd te zijn, maar waarschijnlijk door de droogte was het aantal hoeden veel geringer. Nu maar weer wachten op 1938.

Men heeft mij wel eens geplaagd om mijn tekening van de heksenkring van Vliegenzwam om een berk in ons boekje „Hei en Dennen”. Dat zou „fantasie” geweest zijn. In die dagen fotografeerden we nog niet. Nu, in 1937 hadden wij in de duinen hier bijzonder veel vliegenzwammen en ik kon een foto nemen, die al aardig lijkt op dat gehoode prentje. En eerlijk niets „bijgewerkt” (Fig. 2).

JAC. P. TH.

Heksenkring van Stuifbal. Half Oktober vond ik in een grasperk te Groningen (Petrus Campersingel) een heksenkring — diameter ongeveer drie meter — van *Lycoperdon furfuraceum*. Naar ik meen komt dit bij stuifzwammen lang niet zo algemeen voor als bij meerdere soorten plaatszwammen.

Groningen.

Dr. L. S. WILDERVANCK.



Fig. 1. *Heksenkring van Nevelzwam.*
Elswoud Nov. 1936.

Zeldzame Paddenstoelen. Sedert de opening van het natuur-historisch museum zijn de volgende paddenstoelen, in den omtrek van Tilburg gevonden, in




Fig. 2. *Heksenkring van Vliegenzwam*
om berk.

de collectie paddenstoelen op formaline opgenomen: *Lysurus (Anthurus) australiensis*, afkomstig uit een anjelierenkas in Oosterwijk.

Polyporus melanopus (picipes) afkomstig uit een boomgaard in Tilburg, Groenewoud.

Monstrositeit van *Hypholoma hydrophilum* met *polyporoïde onderkant*. Als een wijdmazig net zijn de openingen der buisjes zichtbaar. Afkomstig uit Goirle, omgeving van De Golf. Dr. A. G. M. LIERNUR.

Vogels in de Wieringermeer. Het broedseizoen der vogels hoort weer tot het verleden, we zijn weer in de tijd van de „Trek”; reeds zien we hier roodborstjes, ijsvogels, Vlaamsche gaaien, enz. die hun gebied uitbreiden. Wat de broedvogels betreft: deze blijven tamelijk constant.

De Meeuwen hebben hun kolonie in Sectie C een paar kavels verlegd.

De Veldduilen die verleden jaar in groot aantal werden aangetroffen waren dit jaar bijna verdwenen, slechts 1 nest zag ik in Sectie D.

't Is toch merkwaardig dat deze vogels alleen verschijnen als er veel ratten en muizen zijn zooals in 1936. Dit jaar was er haast geen uil te zien en ook geen muizen en ratten.

Als nieuwe bewoner zag ik in 't Noorden het Robijntje (kneu) in 't Westen het Blauwborstje (witster). Deze zag ik ook bij Middenmeer zittend op een „Berenklauw”. De Oeverzwaluw handhaaft zich nog steeds.

Ook vond ik dit jaar het nest van een kwartel. Drie jaar had ik er naar gezocht en nu pas gevonden in een kavel erwten. Nog steeds is de Kempphaan en de Kluut enz. bij 't Amstelmeer, hoewel ik vrees dat deze plek het z.g. „Klutengat”, thans eenig in dezen polder, door de rietaanplant op den duur veel van zijn schoonheid verliest.

De fasanten die in 't Zuiden „gepoot” zijn schijnen naar 't noorden te trekken, naar 't bosch. Dit ontwikkelt zich prachtig en belooft veel voor de toekomst als woonplaats voor onze gevederde vrienden, ook ziet men er reeds een enkele egel. We willen hopen dat er ook gauw nestkastjes komen om meezen te herbergen, om zomers paal en perk te stellen aan de vreterij