


- 8) Ik gebruikte de Duitse uitgave van W. Frieboes, A. Corn. Celsus, Ueber die Arzneiwissenschaft in acht Büchern. 1906.
- 9) Pedanios Dioskorides van Anazarbos in Cilicië was een beroemd medicus-botanicus-pharmakoloog uit de eerste eeuw na Chr. Waarschijnlijk is hij militair arts geweest. Zijn hoofdwerk, *Materia medica*, schreef hij omstreeks 77 n. Chr. Ik volg hierbij de Duitse uitgave van Dr. J. Berendes, *Des Pedanios Dioskurides aus Anazarbos Arzneimittellehre in fünf Büchern*. 1902.
- 10) Welke *Urtica*-soorten Dioskorides op 't oog heeft, is niet met zekerheid uit te maken.
- 11) kataplasma = papomslag.
- 12) gangreen = het afsterven van een lichaamsdeel.
- 13) Paulos van Aegina leefde in de 1ste helft van de 7de eeuw n. Chr. De Arabische schrijver Abul Faradsch ($\pm$ 1250) zegt van hem: „Onder de artsen, die in dezen tijd leefden, ($\pm$ 640) was Paulos Aeginetes beroemd”. Hij heeft een medisch werk in zeven boeken geschreven. Ik gebruikte de Duitse uitgave van Dr. J. Berendes, *Paulus von Aegina, Des besten Arztes sieben Bücher*. 1914.
- 14) Gajus Secundus Plinius werd geboren te Comum in 23 n. Chr. Als militair heeft hij vele veldtochten meegemaakt. Bij de uitbarsting van de Vesuvius in 79 vond hij de dood. Van zijn vele geschriften is o.a. bewaard gebleven een omvangrijk, maar lang niet altijd betrouwbaar, encyclopaedisch werk in 37 boeken, namelijk zijn *Historia naturalis*.
- 15) De bedoelde plaats bij Plinius (XXII, 13) luidt: „Articularis morbis et podagricis plurimum cum oleo vetere aut folia cum ursino adipe imponunt” d.i. Tegen jicht en podagra leggen velen er de bladeren (nl. van de *Urtica*) op met oude olie of met berenvet.
- 16) Rembert Dodoens of Dodonaeus was een beroemd Zuid-Nederlands botanicus-medicus (geb. 1517). Hij is ook keizerlijk lijfarts te Weenen geweest en daarna professor te Leiden (gest. 1585).
- 17) Flereciijn (ook fledersijn) = Podagra.
- 18) Dr. W. L. de Vreese, *Middeln. geneesk. recepten en tractaten*. 1894.
- 19) Uitgegeven door Dr. J. H. Gallée in 't *Jahrbuch des Vereins für Niederdeutsche Sprachforschung*. XV. (1889).
- 20) De medicus Leonhart Fuchs gaf in 1543 te Bazel een uitstekend kruidboek uit, dat reeds in 't zelfde jaar ook in Nederlandse vertaling 't licht zag.
- 21) Geboren te Vlissingen omstreeks 1578, gestorven te Terneuzen 1621.
- 22) Ver = verreweg.
- 23) Die ik bedenken kan.
- 24) Jonckvroumercke: *Apium graveolens*, Selderie.
- 25) Ruyte = *Ruta graveolens*, Wijnruit.
- 26) van elk evenveel.
- 27) tezamen gekneet wordt.
- 28) gichtig = jichtig.
- 29) Hadick = *Sambucus ebulus*, Kruidvlier.
- 30) Vijfvingerkruid = *Potentilla reptans*.
- 31) Zie Dr. G. Dragendorff. *Die Heilpflanzen*, 179 en Dr. H. Zörnig, *Arzneidrogen*, II, 360—361.
- 32) Dr. M. A. van Andel, *Volksgeneeskunst in Nederland*, blz. 436.
- 33) C. A. Bakker, *Volksgeneeskunde in Nederland*, blz. 581—583.

Gr.

CHR. S.



NIEUWE PLANTENSOORTEN EN VARIËTEITEN GEVONDEN IN NEDERLAND IN 1937.

In deze en de volgende lijst staat (B.R.) voor B. Reichgelt te Nijmegen, (G.) voor J. v. Giersbergen te St. Michiels Gestel, (J.) voor P. Jansen te Amsterdam, (Ke.) voor J. Kern te Vlaardingen, (Kl.) voor A. W. Kloos Jr. te Dordrecht, (N.J.N.) voor Nederlandsche Jeugdbond voor Natuurstudie, (Th. R.) voor Th. Reichgelt te Nijmegen, (Un.) voor Excursie van meer dan 3 leden der Ned.Bot.Ver., (W.) voor W. H. Wachter te Rotterdam en (We.) voor Prof. Dr. Th. Weevers te Amersfoort.

NIEUWE PLANTENSOORTEN 371

Als merkwaardige vondsten op het gebied van mossen willen wij vermelden:

Webera bulbifera Warnst, nieuw voor ons land, op Vlieland (V. de Vries).

Bryum warmeum Bland, op Vlieland (V. de Vries).

Conocephalus conicus (L.) Dum. te Ruurlo (J. Heimans).

Lophozia lycopodioides (Wallr.) Cogn., Hoge Veluwe (W.).

Athyrium Filix femina var. *nigrostriata* tussen Winterswijk en Borken (N.J.N.).

Digitaria adscendens (H.B.K.) Henr. te 's Hertogenbosch (Kl.).

Stipa trichotoma Nees. var. *parviflora* te Veghel (G. en Kl.).

Crypsis schoenoides Lam. te Erp (Th.R.).

Eragrostis Frankii Steud. te 's Hertogenbosch (Kl.).

Elymus virginicus L. var. *submuticus* Hook. te Hemmen (Jeswiet en Kl.).

Catapodium loliaceum Link. op Texel (J. Schoute).

Myrica Gale f. *hermaphrodites* te Amersfoort (We.).

Chenopodium ubicum L. var. *intermedium* Koch te Erp (Th. R.).

Stellaria media Vill. var. *neglecta* Weihe bij de Keutenberg (Un.).

Lepidium ramosissimum A. Nels. te Weurt 1927 (Ke. en B.R.).

Lepidium austrinum Small. te Erp 1936 (B. en Th.R.).

Epilobium Lamyi, die wij verleden jaar ten onrechte nieuw voor Nederland noemden, was reeds in 1932 door de Weaver in het Natuurhistorisch maandblad voor Brunsum opgegeven.

Ammi majus L. var. *glaucofolium* (L.) Mèrat. te Erp 1936 (Ke. en R.) te W. Knollendam (de Jongh en Kl.).

Petroselinum segetum (L.) Koch var. *major* Magnel te Cadzand (Un.).

Vicia tenuifolia Roth. ssp. *elegans* Arcang. te Swalmen (Kruseman).

Empetrum nigrum L. var. *purpureum* D.C. op Terschelling (Dr. A. G. M. Liernur).

Eupatorium cannabinum L. f. *indivisum* D.C. te Veghel (G. en Kl.).

Carduus nutans L. var. *macrocephalus* (Desf.) Gugler f. fl. *roseis* te Sas v. Gent. (Un.).

Ir. A. W. KLOOS Jr., Dordrecht.

W. H. WACHTER, Rotterdam.

NIEUWE VINDPLAATSEN IN NEDERLAND VAN
ZELDZAME PLANTENSOORTEN IN 1937.

Equisetum silvaticum in Liesbos (Pater Benno).

Asphodelus tenuifolius te Middelburg (Un.).

Himantoglossum hircinum te Goeree (de Tempe en We.).

Andropogon halepense te Dordrecht (Kl.).

Panicum italicum maritimum te Sas van Gent (Un.).

Milium effusum fm. *latifolia* te Geulem (Un.).

Milium effusum m. *bracteatum* te Geulem (Un.).

Bromus lepidus te Neuzen (Un.) te Watergraafsmeer (J. Prins).

Bromus rubens te Zeist (J. v. d. Krogt).

Phragmites communis fm. *latifolia* te Mauritsfort (Un.).

Phragmites communis fm. *salina* te Magdelenapolder en Mauritsfort (Un.).

Phragmites communis fm. *uniflora* te Amsterdam (J.).

Poa sudetica te Geulem (Un.).

Dactylis glomerata ssp. *lobata* fm. *divergens* te Beverwijk (J.).

Dactylis glomerata ssp. *lobata* fm. *luxurians* te Beverwijk (J.).

Dactylis glomerata ssp. *lobata* fm. *pubescens* te Beverwijk (J.).

Festuca arundinacea Uechtriziana te Geulem (Un.).