

AUGUSTUS.

Dit is de tijd van de rijpende en rijpe vruchten, die zoo goed te pas komen voor de vele jonge vogels, hetzij die hier pas onder moeders vleugels vandaan zijn, hetzij ze reeds uit den vreemde komen als vroege trekkers.

Het begint al in Juli met Vogelkers, Lijsterbes, Kraaiheide, Geldersche Roos en de eerste aflevering van Kamperfoelie. Dan volgen al spoedig de Duindoorns en de Duinroosjes, Kardinaalsmuts, Sleedoorn, de Bramen, Wegedoorn, Sporkenhout, Hondсроos, Eglantier en eindelijk de Liguster. Daarna komt nog de tweede aflevering van de Kamperfoelie en de derde, die nog kan samenvallen met het eerste rijpen van de vroegste klimop. Maar daarmee zijn we dan al in October.

Bij de Duinroosjes valt het rijpen van de vruchten samen met het herfstig verkleuren van de bladeren en nog de groei van nieuwe loten. Zodoende praalt het duindoortapijt in pracht van kleuren: licht- en donkergroen, rood, purper, bruin, zwart met daartusschen nog blauwgrijs van rendiermos en het wit of rose van nog een enkel roosje, soms op oude, soms op nieuwe loot. Enkele malen vindt ge uitgestrekte velden van duinroosjes zonder een enkele vrucht; ik weet niet, waaraan dit zou zijn te wijten.

De vruchten van Lijsterbes en Kamperfoelie worden zoowel gegeten om hun vruchtvleesch als om de zaden. Vinken, Matkoppen, Gladkoppen, Goudvinken hebben het vooral op de zaden gemunt. Sommige Lijsterbessen zijn al hun vruchten reeds kwijt in 't begin van Augustus, andere houden het uit tot nog heel laat in de maand. Zoo ook de Wegedoorn; het komt er maar op aan, of de merels ze in de gaten krijgen. Hoe prachtig, die overvloed van glimmende, zwarte bessen aan de Wegedoorn. En even aardig is het Sporkenhout, dat nu eenige maanden achtereen tegelijk te zien geeft de kleine honigrijke bloempjes en de vruchten rijpend door groen en rood naar zwart.

Meidoorn en Sleedoorn rijpen ongeveer gelijktijdig hun vruchten, hoewel hun bloeitijden meer dan een maand uiteen liggen. De Sleedoorn heeft nog al eens een slecht vruchtenjaar, waarschijnlijk het gevolg van nachtvorst en insectenschaarste in April. Ook de Kardinaalsmuts heeft soms arme jaren, maar dan individueel en als gevolg van een vorig jaar van zware dracht.

Die Kardinaalsmuts is erg individueel en een wanhoop en vreugde voor aankomende phaenologen. Sommige prijken in Augustus reeds met prachtig roode vruchten, terwijl andere dan nog pas in het eerste bleekgroene stadium van rijping zijn. Zodoende hebben de lijsters en roodborstjes maanden achtereen de oranje zaden tot hun beschikking en heeft de plant het voordeel van een heel lange „uitzaaitijd” in allerlei omstandigheden van weer en wind. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Sporkenhout. Let ook eens op Heggerank; die heeft ook tegelijk rijpende, rijpe en overrijpe vruchten. Bij Salomonszegel zien we ook verschillen van meer dan een maand. Bij ons hier in Kennemerland is Salomonszegel al haast even „individualistisch” aangelegd als Kardinaalsmuts.

Niet alleen de vogels profiteren van al dit heerlijks. Ook de insecten weten er raad mee. De wespen knabbelen graag aan de sleepruimpjes en aan de goed-rijpe rozebottels en de bramenzoeker moet er eens op letten, dat hij concurrentie ondervindt van vliegen en zelfs van muggen. Vang ze even voor mij, want ik zou nu wel eens precies willen weten wie dat zijn.

JAC. P. TH.