



Punt van de Koepelkerk. Vermoedelijk
1) ♂, 2) ♀, 3) baby.

haar nest gebouwd heeft op de laatst zoo veel besproken wankel punt van de Koepelkerk aan het Leidsche Boschje?

Hierbij een tekening van den toestand die verdere explicaties overbodig maakt, alleen is er te vermelden dat hun nest, heelemaal onbeschermd tegen storm en regen, uit slordig bij elkaar gedragen takken bestaat waarvan soms, bij storm, een wegwaait — zooals ik met de kijker kon zien.

De ouden verscheuren steeds hun prooi op een punt van het topkruis (No. 1 van de tekening) maar waar ze deze vandaan halen en wat het is kan ik van mijn kamer uit niet zien. Jammer genoeg ontdekte ik het huishouden eerst een week of twee geleden dus te laat om de opvoeding van de baby No. 3 te kunnen volgen.

Verder heb ik te vermelden dat juist gisteren een bonte specht in onzen kantoortuin (Heerengracht) kwam en aldaar op een droge acacia-tak flink aan het kloppen ging; het is moeilijk na te gaan, of deze vogel dezelfde was die hier (zooals laatst vermeld) in de lente doortrok, maar het is wel mogelijk dat hij het was „auf dem Wege zurück“, want ik geloof niet, dat er veel bonte spechten in Amsterdam nestelen.

R. OPPENHEIM.

De waarneming van het torenvalkennest in de top van de Koepelkerk is niet nieuw! Zeker reeds veertig jaar geleden broedden de torenvalken geregeld op precies dezelfde manier in die kogel. Destijds was dat van het Leidsche plein af gemakkelijk te zien. Of ze in de tusschenliggende jaren, sedert hooge gebouwen het uitzicht belemmeren, er ook geweest zijn, weet ik niet.

J. Hs.

Groote Zaagbek hier broedend? Mogelijk interesseert u het volgende. Dit voorjaar heeft zich, een paar kribben boven de splitsing Rijn-IJssel, een paartje *groote* Zaagbekken opgehouden. Ongeveer begin Juni (datum ben ik vergeten) zag ik al kanoënde het ♂ zaagbek zwemen. Er bestaat geen twijfel aan of het was de groote zaagbek.

Toen ik ongeveer een week later op dezelfde plaats kwam, de Rijn was intusschen erg gestegen, zag ik het ♂ zoowel als het ♀. Hieruit meende ik te kunnen afleiden, dat het ♀, toen de Rijn nog laag was, had zitten broeden en door het stijgende water van het nest was gejaagd. Lijkt u dit ook waarschijnlijk?

Arnhem, 3 Oct. '38.

T. RENSKEN.

Het is best mogelijk, dat die Zaagbekken hier gebroed hebben. Zij broeden in Noordduitschland tot in Sleeswijk Holstein, ook in Beieren en Zwitserland en overal graag aan zoet water. Zoowel grondbroeder als holenbroeder, wordt zelfs om de eieren aangemoedigd om in nestkorven te broeden, zooals de welbekende eendennesten bij ons in Friesland. Bekend is het dat hij zijn broedgebied in Schotland uitbreidt. Aan de wielen en hanken van onze Boven-Rijn en Geldersche IJssel heeft hij zeker een goede kans. Is er ook een kans, dat alle kanovaarders goede vogelbeschermers worden? Dat is wel wenschelijk.

JAC. P. TH.

Bladkoninkje. In den nacht van 25 op 26 September 1938 werd aan boord van het lichtschip Haaks een vogeltje dood gevonden, dat bij het personeel niet bekend was en mij ter determinatie werd toegezonden. Hoewel de teere vogel verformd was meende ik onmiddellijk met een bladkoninkje of eendennest. **le eendennesten bij ons in Friesland.** Bekend is het dat hij zijn broedgebied in Schotland uitbreidt. Aan de wielen en hanken van onze Boven-Rijn en Geldersche IJssel heeft hij zeker een goede kans. Is er ook een kans, dat alle kanovaarders goede vogelbeschermers worden? Dat is wel wenschelijk.

JAC. P. TH.

Bladkoninkje. In den nacht van 25 op 26 September 1938 werd aan boord van het lichtschip Haaks een vogeltje dood gevonden, dat bij het personeel niet bekend was en mij ter determinatie werd toegezonden. Hoewel de teere vogel verformd was meende ik onmiddellijk met een bladkoninkje of eendennest.

J. DRIJVER.

lichtschip Maas.

arming. In verband met verschillende mededelingen moge ik mijn steentje bijdragen.

1919 en 1923 in den tuin van mijn buurman Dr.

Draaihals, Gladde slang, Insectenvoedingen en vragen in diverse afleveringen
1. Draaihals. Nestelde tusschen