

wikkelen als in run. Of dit een overgang is naar ander voedsel of wel, dat de kever nooit zoo kieskeurig geweest is, als wij vroeger meenden, is een moeilijk te beantwoorden vraag. Ook buiten de duinstreek is hij in ons land wel in mesthoopen te vinden. Men moet er zelf ook een goede neus voor hebben.

Bergen, N.H.; De Haaf; 8 Oct. 1938.

D. MAC GILLAVRY.

Wespen in 1938. Mijn ervaring over 't voorkomen van wespen in 1938 stemt geheel overeen met die van den heer Walrecht. Ik schreef er een kort artikeltje over voor de Entomologische Berichten. Dat zal wel in deze maand verschijnen.

Bergen, N.H.; De Haaf; 8 Oct. 1938.

D. MAC GILLAVRY.

Onze grootste kevers. Dr. Thijssse verzocht laatst opgave van de plaatsen, waar nu nog Vliegende herten voorkomen.

Een mijner kennissen te Hoenderloo heeft voor mij inlichtingen ingewonnen bij boswachters aldaar. Het resultaat was: Rondom Hoenderloo vindt men de kevers sporadisch. Het vorige jaar trof men ze aan in de bossen van het Loo, Uchelen en te Hoenderloo.

Ermelo en Hoog-Soeren werden genoemd als plaatsen, waar ze veelvuldig voorkomen. Een niet-„vak”man noemde de Leusderheide. Hierbij plaats ik dus voorlopig een vraagteken.

Wat de Neushoornkever betreft, deze wordt bij tientallen gevonden in oude, afgewerkte run, die in hopen bij leerlooierijen staat opgetast. Zelf vond ik ze bij een der leerlooierijen te Chaam bij Breda. Buiten de leerlooierijen vond ik ze nooit. Interessant is dan ook een mededeling van Bar.esse Prisse-Röell, wie men een Neushoornkever (mnl.) bracht, gevangen in haar bezittingen onder Ginneken (gemeentegrens Ulvenhout-Chaam), midden in een bos en wel in een stapel houtblokken.

Juli-kevers werden aangetroffen te Oost-Kapelle (Walch.) en te Cadzand (duingeb.).

Biezellinge.

B. J. J. R. WALRECHT.

Steekmuggen en Ringelmuggen in 1938. Wij hebben hier in Bloemendaal aan den duinkant in 1938 in het geheel geen last gehad van deze muggen en lekker geslapen met open ramen, zonder horren, zonder citronel, eucalyptus of wat dies meer zij. Alleen nu in October wagen de overwinteraars nog wel eens een prik. Waarom ze dat doen weet ik niet heelemaal precies.

T.

De witte vlekjes van Atalanta. Ik heb in den mooien September van 1938 zesenvijftig Atalanta's ontmoet op verschillende bloemen. Ze lieten zich rustig bekijken en geen enkele had een wit vlekje in den rooden band van den voorvleugel. Het schijnt dus nu weer zeldzaam te zijn. Nu moeten we in komende jaren er op gaan letten, of het ding weer voor den dag komt. En nog aardiger lijkt het mij, dat bezitters van vlinderverzamelingen eens hun witvlekkige exemplaren met plaats en datum zouden willen vermelden.

T.

Medewerking verzocht. Ten einde te kunnen komen tot een zoo volledig mogelijke kennis van de soorten *Goudwespen* (*Chrysididae* en *Cleptidae*), die totnutoe in ons land aangetroffen zijn, verzoek ik allen (musea, vereenigingen, scholen en particulieren), die in het bezit zijn van zoodanige insecten, vriendelijk, mij deze tijdelijk ter determinatie of revisie af te staan. Na eenigen tijd ontvangt men dan zijn dieren zooveel mogelijk gedetermineerd terug. Tenzij de eigenaar het mij nadrukkelijk toestaat, houd ik van het ingezondene niets achter voor mijn eigen verzameling. Het verdient aanbeveling, elk voorwerp te voorzien van een vindplaats-etiket, waarop zoo mogelijk ook de datum van het vinden aangegeven is; doch in elk geval dient men volledige zekerheid te hebben, dat de dieren binnen de grenzen van Nederland gevangen zijn. De kleinste hoeveelheid is welkom, evengoed als grotere aantallen.

Velp (Gld.), Hoogeweg 18.

J. KOORNNEEF.

Lathyrus montanus bij Schipborg (Dr.). In Juni j.l. vond ik bij Schipborg in Noord-Drente in vrij groot aantal *Lathyrus montanus*, een plant uit Zuid-Limburg en het Nijmeegsche. Daar wijlen prof. Veldhuizen indertijd verschillende plantensoorten in die omgeving heeft laten verwilderen, zal dit misschien ook met *Lathyrus montanus* het geval zijn geweest. Mochten er lezers zijn, die omtrent de verspreiding van deze lathyrussoort nadere bijzonderheden weten, dan zal ik daar zeer gaarne kennis van nemen.

Oosterbeek.

W. E. G. DE BRUIN.

De noordelijkste vindplaatsen in ons land van *Lathyrus montanus* die ik ken zijn: Zelfhem bij Doetinchem, Lutterzand bij Denekamp, Kolmschate bij Deventer. Vermoedelijk zullen de planten bij Schipborg wel uit „de Adderhorst” van Prof. v. Veldhuizen stammen.

J. HS.